

POŠTOVANI POLJOPRIVREDNI PROIZVOĐAČI I DRAGI GLEDAOCI DOBRO DOŠLI U „ZELENU PROGNOZU“
DANAS VAS INFORMIŠEMO O MERAMA ZAŠTITE ULJANE REPICE OD REPIČINOG SJAJNIKA

.....

NA PODRUČJU VOJVODINE USEVI ULJANE REPICE SE NALAZE U RAZLIČITIM FAZAMA RAZVOJA PUPOLJAKA.

VIZUELNIM PREGLEDIMA USEVA ULJANE REPICE REGISTROVANO JE PRISUSTVO REPIČINOG SJAJNIKA NA PUPOLJCIMA.

REPIČIN SJAJNIK JE EKONOMSKI NAJZNAČAJNIJA ŠTETOČINA ULJANE REPICE. ODRASLE JEDINKE SJAJNIKA POJAVLJUJU SE RANO U PROLEĆE I POČINJU DA SE HRANE POLENOM KOROVSKIH BILJAKA. ČIM POČNE FORMIRANJE CVETNIH PUPOLJAKA U USEVIMA ULJANE REPICE PRELAZE NA NJIH. U POTRAZI ZA POLENOM BUŠE I IZGRIZAJU PUPOLJKE KOJI SE NE OTVARAJU, SUŠE I OPADAJU. NAJVEĆE ŠTETE NASTAJU UKOLIKO JE USEV NAPADNUT U POČETNIM FAZAMA RAZVOJA PUPOLJAKA. REPIČIN SJAJNIK JE ŠTETAN SAMO DO POČETKA CVETANJA JER SE NAKON OTVARANJA CVETOVA ODRASLE JEDINKE HRANE POLENOM.

PREPORUKA

VIZUELNIM PREGLEDIMA USEVA ULJANE REPICE ODRASLE JEDINKE REPIČINOG SJAJNIKA REGISTROVANE SU PRE 10-TAK DANA I OD TADA SE NJIHOVA BROJNOST POVEĆAVA. PO STABILIZACIJI VREMENSKIH PRILIKA, KOJA SE NAJAVLJUJE POČETKOM SLEDEĆE NEDELJE, PREPORUČUJE SE PREGLED USEVA ULJANE REPICE U NAJTOPLIJEM DELU DANA RADI UTVRĐIVANJA PRISUSTVA REPIČINOG SJAJNIKA NA PUPOLJCIMA. UKOLIKO SE UTVRDI PRISUSTVO TE ŠTETOČINE NA NIVOU PRAGA ŠTETNOSTI OD 0,8 SJAJNIKA PO CVASTI U FAZI POČETKA OBRAZOVANJA PUPOLJAKA NA TERMALNIM CVASTIMA ILI 1-1,5 SJAJNIK U FAZI KADA SU PUPOLJCI JOŠ NEDIFERENCIRANI I ZBIJENI U CVASTI PREPORUČUJE SE PRIMENA NEKOG OD REGISTROVANIH INSEKTICIDA:

PREPARAT	AKTIVNA MATERIJA	DOZA
FASTAC 10 EC, FASCORD EC	ALFA-CIPERMETRIN	0,1 L/HA
FASTAC ME	ALFA-CIPERMETRIN	0,2 - 0,3 L/HA
DURBIN EW	CIPERMETRIN	0,3 - 0,6 L/HA
DURBIN 200 EW	CIPERMETRIN	0,15 - 0,3 L/HA
DECIS 2,5 EC, KONFUZIJA, POLUX	DELTAMETRIN	0,2 - 0,3 L/HA
DECIS EXPERT	DELTAMETRIN	0,075 L/HA
SIVANTO ENERGY	FLUPIRADIFURON+DELTAMETRIN	0,75 L/HA
KARATE ZEON	LAMBDA-CIHALOTRIN	0,25 - 0,35 L/HA
GROM	LAMBDA-CIHALOTRIN	0,25 L/HA
MAVRIK	TAU-FLUVALINAT	0,15 - 0,2 L/HA
AVAUNT 15 EC	INDOKSAKARB	0,5 - 0,75 L/HA

U FAZI CVETANJA PRIMENA INSEKTICIDA JE ZABRANJENA! PRILIKOM PRIMENE PESTICIDA, TREBA SE PRIDRŽAVATI UPUTSTVA ZA UPOTREBU I PREDUZETI SVE MERE U CILJU ZAŠTITE PČELA I DRUGIH OPRAŠIVAČA!



SLIKA 1. USEV ULJANE REPICE



SLIKA 2. FAZA RAZVOJA ULJANE REPICE



SLIKA 3. ODRASLE JEDINKE REPIČINOG SJAJNIKA NA PUPOLCIMA



SLIKA 4. ODRASLE JEDINKE REPIČINOG SJAJNIKA NA PUPOLCIMA



SLIKA 5. ODRASLA JEDINKA REPIČINOG SJAJNIKA NA PUPOLCIMA



SLIKA 6. ODRASLA JEDINKA REPIČINOG SJAJNIKA NA PUPOLCIMA



SLIKA 7. ISHRANA ODRASLE JEDINKE REPIČINOG SJAJNIKA NA PUPOLJCIMA



SLIKA 8. OŠTEĆENI PUPOLJCI ULJANE REPICE OD ISHRANE REPIČINOG SJAJNIKA

POŠTOVANI POLJOPRIVREDNI PROIZVOĐAČI I DRAGI GLEDAOCI, DETALJNIJE INFORMACIJE O POJAVI ŠTETNIH ORGANIZAMA I MERAMA KONTROLE MOŽETE POGLEDATI NA SAJTU PROGNOZNO IZVEŠTAJNE SLUŽBE ZAŠTITE BILJA VOJVODINE WWW.PISVOJVODINA.COM