

POŠTOVANI POLJOPRIVREDNI PROIZVOĐAČI I DRAGI GLEDAOCI DOBRO DOŠLI U „ZELENU PROGNOZU“

DANAS VAS INFORMIŠEMO O AKTUELNOJ ZAŠTITI TREŠNJE I VIŠNJE OD ŠTETOČINA I BOLESTI

.....

NA PODRUČJU VOJVODINE PROIZVODNI ZASADI TREŠANJA I VIŠANJA SE, U ZAVISNOSTI OD LOKALITETA I SORTIMENTA, NALAZE U RAZLIČITIM FAZAMA RAZVOJA PLODOVA. U TOKU JE BERBA RANIH SORTI TREŠNJE, DOK SE ZASADI TREŠANJA SA SREDNJIM I KASNIM SORTIMENTOM KAO I ZASADI VIŠANJA NALAZE U RAZLIČITIM FAZAMA RAZVOJA PLODOVA, OD PLOD OKO 70% KRAJNJE VELIČINE DO FAZE POČETKA SAZREVANJA PLODOVA.

U NAŠOJ PROIZVODNJI TREŠANJA I VIŠANJA NAJZNAČAJNIJA ŠTETOČINA JE TREŠNJINA MUVA. ŽENKE TE ŠTETOČINE ZASECAJU POKOŽICU PLODA I U NJEGA POLAŽU JAJA. JAJA POLAŽU U PLODOVE KOJI SU U RAZLIČITIM FAZAMA ZRENJA. NAJVEĆE ŠTETE PRIČINJAVAJU LARVE KOJE SE RAZVIJAJU UNUTAR PLODOVA I HRANE NJEGOVIM SADRŽAJEM. NAPADNUTI PLODOVI GUBE TRŽIŠNU VREDNOST.

NA PODRUČJU AP VOJVODINE U TOKU JE LET TREŠNJINE MUVE. NA KLOPKAMA ZA PRAĆENJE LETA TE ŠTETOČINE REGISTRUJE SE ULOV ODRASLIH JEDINKI.

#### PREPORUKA

U ZASADIMA TREŠANJA I VIŠANJA KOJI SU U FAZAMA SAZREVANJA PLODOVA, SA CILJEM ZAŠTITE OD TREŠNJINE MUVE I SPREČAVANJA POLAGANJA JAJA U PLODOVE, PREPORUČUJE SE PRIMENA NEKOG OD SLEDEĆIH INSEKTICIDA UZ OBAVEZNO POŠTOVANJE KARENCE:

PREPARAT	AKTIVNA MATERIJA	KONCENTRACIJA	KARENCA
DECIS EXPERT	DELTAMETRIN	0,175 L/HA	7 DANA
KESTREL, AFINEX, ZLATOSPILAN SP	ACETAMIPRID	0,025%	14 DANA
DECIS 2,5 EC, FUTOCIS EC 2,5, KONFUZIJA	DELTAMETRIN	0,07%	14 DANA
LAMDEX	LAMBDA-CIHALOTRIN	0,05-0,07%	14 DANA

U FAZAMA SAZREVANJA PLODOVI SU OSETLJIVI NA INFEKCIJU GLJIVAMA RAZLIČITIH PROUZROKOVAČA TRULEŽI. USLOVI U PROIZVODNJI U PRETEKLIM PERIODU, SA ČESTIM PADAVINAMA I DUGOTRAJNIM VLAŽENJEM PLODOVA, VEOMA SU POVOLJNI ZA RAZVOJ NAVEDENIH PATOGENA. TAKOĐE, OVAKVI USLOVI POVOLJNI SU I ZA RAZVOJ PROUZROKOVAČA PEGAVOSTI LIŠĆA VIŠNJE I TREŠNJE.

U ZASADIMA VIŠANJA I TREŠANJA SA CILJEM SUZBIJANJA NAVEDENIH PATOGENA PREPORUČUJE SE PRIMENA NEKOG OD FUNGICIDA VODEĆI RAČUNA DA SE ISPOŠTUJE KARENCA TJ. VREME OD POSLEDNJEG TRETMANA DO BERBE:

PREPARAT	AKTIVNA MATERIJA	DOZA/KONCENTRACIJA	KARENCA
LUNA SENSATION	FLUOPIRAM+TRIFLOKSISTROBIN	0,167 L/HA	3 DANA

SIGNUM, LUMINIS	BOSKALID + PIRAKLOSTROBIN	0,562 – 0,75 KG/HA	14 DANA
--------------------	---------------------------	--------------------	---------

**PRILIKOM PRIMENE PESTICIDA OBAVEZNO TREBA VODITI RAČUNA O KARENCI PRIMENJENIH PREPARATA. U ZASADIMA TREŠANJA GDE JE BERBA U TOKU ILI SE ONA OČEKUJE U NAREDNIM DANIMA NE PREPORUČUJE SE PRIMENA HEMIJSKIH MERA ZAŠTITE.**



SLIKA 1. FAZA RAZVOJA TREŠNJE



SLIKA 2. ODRASLA JEDNIKA TREŠNJINE MUVE NA PLODU VIŠNJE



SLIKA 3. ODRASLA JEDNIKA TREŠNJINE MUVE NA KLOPCI



SLIKA 4. SIMPTOM TRULEŽI KOŠTIČAVOG VOĆA



SLIKA 5. SIMPTOM PEGAVOSTI LIŠĆA VIŠNJE I TREŠNJE

.....  
POŠTOVANI POLJOPRIVREDNI PROIZVOĐAČI I DRAGI GLEDAOCI, DETALJNIJE INFORMACIJE O  
POJAVI ŠTETNIH ORGANIZAMA I MERAMA KONTROLE MOŽETE POGLEDATI NA SAJTU  
PROGNOZNO IZVEŠTAJNE SLUŽBE ZAŠTITE BILJA VOJVODINE [WWW.PISVOJVODINA.COM](http://WWW.PISVOJVODINA.COM)