

BILJNA VRSTA: **SVE**

ŠTETNI ORGANIZMI: **SVI**

OVO JE POSLEDNJA EMISIJA U OVOJ GODINI U ČIJOJ REALIZACIJI UČESTVUJE PROGNOZNO-IZVEŠTAJNA SLUŽBA ZAŠTITE BILJA VOJVODINE. U PERIODU OD PRVOG MARTA DO PRVOG SEPTEMBRA KADA JE I NAJAKTUELNIJA ZAŠTITA POLJOPRIVREDNIH KULTURA OD ŠTETNIH ORGANIZAMA, INFORMIŠEMO VAS KOJE PROIZVODNJE SU UGROŽENE, KOJI ŠTETNI ORGANIZMI ĆE SE POJAVITI ILI SU PRISUTNI NA POLJIMA VOJVODINE I KOJE MERE TREBA PREDUZETI KAKO BI SE SAČUVALI PRINOSI I KVALITET NAŠIH POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA.

U PROTEKLIH JEDANAEST SEZONA, KOLIKO VEĆ POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO FINANSIRA REALIZACIJU OVE EMISIJE, PROGNOZNO-IZVEŠTAJNA SLUŽBA JE UČESTVOVALA U IZRADI 1292 EMISIJE, A SAMO TOKOM OVE SEZONE 132 VEČERI SMO VAS INFORMISALI KOJE MERE TREBA PREDUZETI U ZAŠTITI BILJA OD PROUZROKOVAČA BOLESTI I ŠTETOČINA.

PORED REDOVNOG MONITORINGA ŠTETNIH ORGANIZAMA, U NAŠEM SISTEMU VRŠI SE I MONITORING USLOVA U KOJIMA SE ODVIJA POLJOPRIVREDNA PROIZVODNJA I TO POMOĆU AUTOMATSKIH METEOROLOŠKIH STANICA KOJE SU SMEŠTENE NEPOSREDNO U USEVE I ZASADE. NA OSNOVU ZABELEŽENIH USLOVA, MOŽEMO REĆI DA JE **PROLEĆNI DEO SEZONE** (APRIL, MAJ, JUN) OBELEŽILO VEOMA VLAŽNO VREME, SA OBILNIM PADAVINAMA, ŠTO JE FAVORIZOVALO RAZVOJ PATOGENA U USEVIMA I ZASADIMA, A NAROČITO PROUZROKOVAČA PLAMENJAČE I TO U USEVIMA KROMPIRA, LUKA, TIKVICA, KRASTAVACA, SUNCOKRETA, VINOVE LOZE ŠTO JE IZISKIVALO VEĆI BROJ TRETMANA NEGO ŠTO JE UOBIČAJENO. OSIM PADAVINA, APRIL I MAJ JE OBELEŽILO I HLADNIJE VREME, ŠTO JE SVE ZNAČAJNO ODLOŽILO SETVU JARIH USEVA. U USEVIMA STRNIH ŽITA JE TOKOM OVE GODINE KONSTATOVAN VISOK NIVO PRISUSTVA SIMPTOMA BILJNIH BOLESTI, A NAROČITO SIMPTOMA ŽUTE LISNE RĐE. NA JEDNOM BROJU PARCELA GDE SU IZOSTALE PRAVOVREMENE MERE ZAŠTITE ILI SU PRIMENJENI NEADEKVATNI FUNGICIDI, DOŠLO JE DO ŠIRENJA SIMPTOMA BOLESTI, PRVENSTVENO ŽUTE LISNE RĐE ŠTO SE NEGATIVNO ODRAŽILO NA PRINOS.

U **LETNJEM DELU SEZONE** U NEKOLIKO NAVRATA POJEDINA PROIZVODNA PODRUČJA SU POGOĐENA VREMENSKIM NEPOGODAMA PRAĆENIM OLUJNIM VETROM I GRADONOSNIM PADAVINAMA I REGISTROVANE SU ZNAČAJNE ŠTETE NA USEVIMA I ZASADIMA. NA POJEDINIM PARCELAMA KUKURUZA, SUNCOKRETA, REGISTROVANE SU ŠTETE I DO 100%, A POJEDINI VOĆNJACI KOJI SU BILI U JEKU BERBE ILI JE ONA TREBALA DA NASTUPI, POTPUNO SU UNIŠTENI. TOKOM JULA ZABELEŽENE SU IZUZETNO VISOKE TEMPERATURE VAZDUHA I TZV. TOPLOTNI TALASI, ŠTO JE IZUZETNO POGODOVALO RAZVOJU ŠTETOČINA, NAROČITO GRINJAMA. TOKOM JULA I AVGUSTA POVRTARSKU PROIZVODNJU JE OBELEŽILO INTENZIVNO PRISUSTVO KUKURUZNE (PAMUKOVE) SOVICE. NA POJEDINIM PARCELAMA JE ZABELEŽEN IZUZETNO JAK NAPAD OVE ŠTETOČINE, SA PRISUSTVOM JAJA NA PREKO 90% BILJAKA, ŠTO JE IZISKIVALO VEĆI BROJ INSEKTICIDNIH TRETMANA.



POŠTOVANI GLEDAOCI, IAKO PIS VIŠE NEĆE UČESTVOVATI U REALIZACIJI ZELENE PROGNOZE DO SLEDEĆEG MARTA, NASTAVLJA SE REDOVNI MONITORING NAJZNAČAJNIJIH POLJOPRIVREDNIH PROIZVODNJI I SVE AKTUELNE INFORMACIJE O POJAVI I KRETANJU ŠTETNIH ORGANIZAMA KAO I MERAMA KONTROLE MOŽETE POGLEDATI NA SAJTU PROGNOZNO IZVEŠTAJNE SLUŽBE ZAŠTITE BILJA VOJVODINE WWW.PISVOJVODINA.COM.



SLIKA 1. AUTOMATSKA METEOROLOŠKA STANICA U USEVU ŠEĆERNE REPE



SLIKA 2. AUTOMATSKA METEOROLOŠKA STANICA U ZASADU JABUKE




SLIKA 3. SIMPTOMI PLAMENJAČE NA RAZLIČITIM BILJNIM VRSTAMA




SLIKA 4. SIMPTOMI ŽUTE LISNE RĎE NA PŠENICI



SLIKA 5. SIMPTOMI NAPADA GRINJA NA RAZLIČITIM BILJNIM VRSTAMA



SLIKA 6. POSLEDICE OŠTEĆENJA OD GRADA NA RAZLIČITIM BILJNIM VRSTAMA



SLIKA 7. JAJA I LARVE KUKURUZNE (PAMUKOVE) SOVICE NA RAZLIČITIM BILJNIM VRSTAMA