

POŠTOVANI POLJOPRIVREDNI PROIZVOĐAČI I DRAGI GLEDAOCI DOBRO DOŠLI U „ZELENU PROGNOZU“
DANAS VAS INFORMIŠEMO O POTREBI SPROVOĐENJA JOŠ JEDNOG TRETMANA U CILJU SUZBIJANJA CIKADE *Scaphoideus titanus* U ZASADIMA VINOVE LOZE

NA PODRUČJU VOJVODINE VINOVA LOZA SE U ZAVISNOSTI OD SORTIMENTA I REGIONA NALAZI U RAZLIČITIM FAZAMA RAZVOJA PLODA: OD FAZE BOBICE VELIČINE GRAŠKA DO FAZE POČETAK DODIRIVANJA BOBICA.



SLIKA 1. FAZA RAZVOJA VINOVE LOZE

CIKADA *Scaphoideus titanus*

CIKADA *Scaphoideus titanus* JE VEOMA ZNAČAJNA ŠTETOČINA VINOVE LOZE. U NAŠOJ ZEMLJI JE PRVI PUT REGISTROVANA 2004. GODINE I NALAZI SE NA A2 LISTI KARANTINSKIH ŠTETOČINA.

DIREKTNE ŠTETE KOJE NASTAJU USLED ISHRANE OVE CIKADE SU ZANEMARLJIVE, JER ČAK NI PRI VISOKOJ BROJNOSTI POPULACIJE SIMPTOMI OŠTEĆENJA NISU VIDLJIVI. MNOGO ZNAČAJNIJE ŠTETE SE OGLEDAJU U ČINJENICI DA JE OVA CIKADA VEKTOR FITOPLAZME *Flavescence doree* KOJA PROUZROKUJE **ZLATASTO ŽUTILO VINOVE LOZE**. OVO JE VEOMA DESTRUKTIVNO OBOLJENJE VINOVE LOZE KOJE JE DOVELO DO KRČENJA VELIKOG BROJA ZASADA U NAŠOJ ZEMLJI.



SLIKA 2. SIMPTOM ZLATASTOG ŽUTILA VINOVE LOZE NA BELOJ SORTI



SLIKA 3. SIMPTOM ZLATASTOG ŽUTILA VINOVE LOZE NA CRVENOJ SORTI

25. JUNA SMO VAS INFORMISALI O POČETKU POJAVE LARVI TREĆEG RAZVOJNOG STUPNJA CIKADE *Scaphiodes titanus* U VINOGRADIMA I MERAMA ZA NJIHOVO SUZBIJANJE. TRENUTNO SE VIZUELNIM PREGLEDIMA VINOGRADA REGISTRUJE DOMINANTNO PRISUSTVO TREĆEG LARVENOG STUPNJA RAZVOJA OVE ŠTETOČINE.



SLIKA 4. LARVA TREĆEG RAZVOJNOG STUPNJA CIKADE *S. titanus*

PREPORUKA

S OBZIROM DA SE U VINOGRADIMA I DALJE REGISTRUJE PRISUSTVO LARVI CIKADE VEKTORA ZLATASTOG ŽUTILA VINOVE LOZE, SA CILJEM NJENOG SUZBIJANJA I SPREČAVANJA ZARAZA VINOVE LOZE FITOPLAZMOM, POTREBNO JE SPROVESTI JOŠ JEDAN INSEKTICIDNI TRETMAN:

PREPARAT	AKTIVNA MATERIJA	DOZA/KONCENTRACIJA
ELISA	BUPROFEZIN	0,06%
FURY 10 EC	ZETA-CIPERMETRIN	0,01-0,015%

PORED SUZBIJANJA VEKTORA, MERE KONTROLE ZLATOSTOG ŽUTILA SU I STALNI SANITARNI PREGLEDI ZASADA, OBAVEZNO UKLANJANJE OBOLELIH ČOKOTA, UNIŠTAVANJE DIVLJE LOZE U OKRUŽENJU PROIZVODNIH ZASADA, UNIŠTAVANJE KOROVA I UNIŠTAVANJE I KRČENJE NAPUŠTENIH ZASADA VINOVE LOZE.

U SVIM VINOGRJIMA NA PODRUČJU VOJVODINE ZAPOČELO JE PILJENJE LARVI DRUGE GENERACIJE PEPELJASTOG GROŽĐANOG MOLJCA (*Lobesia botrana*). NAVEDENI INSEKTICIDI ZA SUZBIJANJE CIKADE DELOVAĆE I NA SUZBIJANJE OVE ŠTETOČINE.

PORED SUZBIJANJA ŠTETOČINA TREBA NASTAVITI I SA ZAŠTITOM VINOVE LOZE OD PROUZROKOVAČA BOLESTI. DETALJNIJE INFORMACIJE O MERAMA ZAŠTITE MOŽETE POGLEDATI NA PORTALU PROGNOZNO-IZVEŠTAJNE SLUŽBE ZAŠTITE BILJA VOJVODINE.

.....

POŠTOVANI POLJOPRIVREDNI PROIZVOĐAČI I POŠTOVANI GLEDAOCI, DETALJNIJE INFORMACIJE O POJAVI ŠTETNIH ORGANIZAMA I MERAMA KONTROLE MOŽETE POGLEDATI NA SAJTU PROGNOZNO IZVEŠTAJNE SLUŽBE ZAŠTITE BILJA VOJVODINE WWW.PISVOJVODINA.COM