

POŠTOVANI POLJOPRIVREDNI PROIZVOĐAČI I DRAGI GLEDAOCI DOBRO DOŠLI U „ZELENU PROGNOZU“

DANAS VAS INFORMIŠEMO O AKTUELNIM MERAMA ZAŠTITE JEČMA

.....

NA PODRUČJU VOJVODINE USEVI JEČMA SE, U ZAVISNOSTI OD ROKA SETVE, NALAZE U FAZI OD POČETKA VLATANJA DO POJAVE DRUGOG KOLENCA.

PRE PET DANA SMO VAS INFORMISALI O PRISUSTVU SIMPTOMA BOLESTI U USEVIMA JEČMA I POTREBI SPROVOĐENJA HEMIJSKIH MERA ZAŠTITE. MEĐUTIM, VREMENSKI USLOVI DO JUČE NISU BILI POVOLJNI ZA PRIMENU FUNGICIDA JER SU TEMPERATURE VAZDUHA BILE NISKE A OD PROŠLOG ČETVRTKA PA SVE DO NEDELJE SU REALIZOVANE I PADAVINE RAZLIČITOG INTENZITETA.

DANAS ŽELIMO DA VAS PODSETIMO NA PRISUSTVO SIMPTOMA BILJNIH BOLESTI U USEVIMA JEČMA I TO SLEDEĆIH:

- MREŽASTE PEGAVOSTI LISTA JEČMA (*Pyrenophora teres*)
- PEPELNICE ŽITA (*Erysiphe graminis*) I
- SOČIVASTE PEGAVOSTI LISTA JEČMA (*Rhynchosporium secalis*)

TREKUTNI NIVO PRISUSTVA SIMPTOMA BILJNIH BOLESTI NA USEVIMA JEČMA JE RAZLIČIT I ZAVISI OD LOKALITETA, SORTIMENTA, UZRASTA I SKLOPA BILJAKA, PREDUSEVA, UČESTALOSTI GAJENJA JEČMA NA ODREĐENOM PODRUČJU I DR.

OD NAVEDENIH BOLESTI, NAJZNAČAJNIJE JE PRISUSTVO MREŽASTE PEGAVOSTI LISTA JEČMA. NA PARCELAMA IZ NAJRANIJIH ROKOVA SETVE, GDE SU SIMPTOMI MREŽASTE PEGAVOSTI NA LISTU UOČENI JOŠ U TREĆOJ DEKADI OKTOBRA, SADA SE REGISTRUJU SIMPTOMI I NA PREKO 70% BILJAKA.

PRISUSTVO ZARAŽENIH LISTOVA SMANJUJE ASIMILACIONU POVRŠINU LISTA I DOVODI DO SMANJENJA TEŽINE ZRNA, ODNOSNO SMANJENJA PRINOSA JEČMA.

## PREPORUKA

NA POJEDINIM PARCELAMA JEČMA, KOJI SU UŠLI U OSETLJIVU FAZU RAZVOJA, FAZU VLATANJA, POSTIGNUTI SU EPIDEMIJSKI PRAGOVİ ŠTETNOSTI.

NA PARCELAMA GDE SE U FAZI PRVOG KOLENCA UTVRDI PREKO 10% BILJAKA SA SIMPTOMIMA BOLESTI, PREPORUKA JE PRIMENA HEMIJSKIH MERA ZAŠTITE.

U USEVIMA JEČMA, ZA SUZBIJANJE PROUZROKOVAČA BOLESTI LISTA I STABLA SU REGISTROVANI SLEDEĆI FUNGICIDI:


PREPARAT	AKTIVNA MATERIJA	DOZA
ELATUS PLUS	BENZOVINDIFLUPİR	0,75 KG/HA
PROTENDO	PROTIKONAZOL	0,8 L/HA
DUETT ULTRA	EPOSIKONAZOL+TİOFANAT METIL	0,4 -0,6 L/HA
ELATUS ERA	PROTIKONAZOL+BENZOVINDIFLUPİR	0,5-1 L/HA

DELARO 325 SC	PROTIOKONAZOL+TRIFLOKSISTROBIN	0,7-1 L/HA
DELARO FORTE	PROTIOKONAZOL+SPIROKSAMIN+TRIFLOKSISTROBIN	0,75 L/HA
FALCON FORTE	SPIROKSAMIN+TEBUKONAZOL+PROTIOKONAZOL	0,7-1 L/HA
AMISTAR EXTRA	AZOKSISTROBIN+CIPROKONAZOL	0,5-0,75 L/HA
TEATAR PLUS	AZOKSISTROBIN+DIFENOKONAZOL	0,6-1 L/HA
ANTRE PLUS	TEBUKONAZOL+TIOFANAT-METIL	1,5 L/HA
SPHERE	TRIFLOKSISTROBIN+CIPROKONAZOL	0,5 L/HA
ZANTARA	TEBUKONAZOL+BIKSAFEN	1-1,25 L/HA
ASCRA XPRO	BIKSAFEN+SPIROKSAMIN+PROTIOKONAZOL	0,9-1,2 L/HA
CAYUNIS	BIKSAFEN+SPIROKSAMIN+TRIFLOKSISTROBIN	0,8-1 L/HA
PRIAXOR EC	FLUKSAPIROKSAD+PIRAKLOSTROBIN	0,75-1,5 L/HA

HEMIJSKE MERE ZAŠTITE TREBA SPROVESTI KADA TEMPERATURE VAZDUHA DOSTIGNU 15°C ZBOG EFIKASNIJEG DELOVANJA FUNGICIDA.



SLIKA 1. SIMPTOM MREŽASTE PEGAVOSTI LISTA JEČMA



SLIKA 2. SIMPTOMI MREŽASTE PEGAVOSTI LISTA JEČMA



SLIKA 3. SIMPTOM MREŽASTE PEGAVOSTI NA LISTU JEČMA





SLIKA 4. SIMPTOMI PEPELNICE NA LISTU JEČMA



SLIKA 5. SIMPTOMI SOČIVASTE PEGAVOSTI LISTA JEČMA





SLIKA 6. SIMPTOMI MREŽASTE PEGAVOSTI LISTA JEČMA I SOČIVASTE PEGAVOSTI

.....  
POŠTOVANI POLJOPRIVREDNI PROIZVOĐAČI I POŠTOVANI GLEDAOCI, DETALJNIJE  
INFORMACIJE O POJAVI ŠTETNIH ORGANIZAMA I MERAMA KONTROLE MOŽETE POGLEDATI  
NA SAJTU PROGNOZNO IZVEŠTAJNE SLUŽBE ZAŠTITE BILJA VOJVODINE  
[WWW.PISVOJVODINA.COM](http://WWW.PISVOJVODINA.COM)