

POŠTOVANI POLJOPRIVREDNI PROIZVOĐAČI I DRAGI GLEDAOCI DOBRO DOŠLI U „ZELENU PROGNOZU“  
DANAS VAS INFORMIŠEMO O PRISUTNIM ŠTETOČINAMA U PROIZVODNJI KUPUSA

---

## **FAZE KUPUSA**

NA PODRUČJU VOJVODINE USEVI RANOG KUPUSA SE NALAZE U FAZI OD GLAVICA DOSTIGLA 80% KRAJNJE VELIČINE DO GLAVICE SPREMNE ZA BERBU, USEVI KUPUSA ZA LETNJU PROIZVODNJU SE NALAZE U FAZI OD 6 DO 9 I VIŠE LISTOVA RAZVIJENO I POČELO JE RASAĐIVANJE KUPUSA NAMENJENIH ZA JESENJU PROIZVODNJU.



SLIKA 1. USEV KUPUSA

VIZUELNIM PREGLEDIMA USEVA KUPUSA REGISTROVANO JE PRISUSTVO KUPUSOVOG MOLJCA I BUVAČA.

### **KUPUSOV MOLJAC (*Plutella xylostella*)**

KUPUSOV MOLJAC JE VEOMA ZNAČAJNA ŠTETOČINA U PROIZVODNJI KUPUSNJAČA. TOKOM JEDNE GODINE U NAŠIM USLOVIMA RAZVIJA SEDAM DO OSAM GENERACIJA.

ŠTETE PRIČINJAVAJU GUSENICE KOJE SE HRANE LISTOVIMA KUPUSNJAČA, A U KASNIJIM FAZAMA RAZVOJA UBUŠUJU SE U GLAVICU. PRI JAČEM NAPADU DOLAZI DO GOLOBRSTA KADA OSTAJU SAMO GLAVNI NERVI NA LISTOVIMA.

VIZUELNIM PREGLEDOM USEVA KUPUSA REGISTROVANO JE PRISUSTVO GUSENICA NA NALIČJU LISTOVA. NA PODRUČJU VOJVODINE U TOKU JE PILJENJE GUSENICA ČETVRTE GENERACIJE KUPUSOVOG MOLJCA.



SLIKA 2. GUSENICA KUPUSOVOG MOLJCA NA NALIČJU LISTA KUPUSA





SLIKA 3. GUSENICA KUPUSOVOG MOLJCA NA NALIČJU LISTA KUPUSA

### **BUVAČI (*Phyllotreta sp.*)**

NA BILJKAMA KUPUSA REGISTROVANO JE PRISUSTVO ODRASLIH JEDINKI BUVAČA. U NAŠIM USLOVIMA BUVAČ RAZVIJA JEDNU GENERACIJU GODIŠNJE. ŠTETE PRIČINJAVAJU ODRASLE JEDINKE IZGRIZAJUĆI I PRAVEĆI RUPICE NA LIŠĆU. NAROČITO SU AKTIVNI ZA VREME SUNČANIH DANA I MOGU PRIČINITI ZNAČAJNE ŠTETE NA MLADIM BILJKAMA.



SLIKA 4. ODRASLE JEDINKE BUVAČA NA LISTU KUPUSA





SLIKA 5. ODRASLE JEDINKE BUVAČA NA LISTU KUPUSA

### PREPORUKA

U USEVIMA RANIH KUPUSA KOJI SE NEĆE BRATI U NAREDNIH NEDELJU DANA PREPORUČUJE SE PRIMENA NEKOG OD SLEDEĆIH INSEKTICIDA:

PREPARAT	AKTIVNA MATERIJA	DOZA	KARENCA
ALVERDE	METAFLUMIZON	1 L/HA	7 DANA

MAVRIK	TAU-FLUVALINAT	0,3 L/HA	7 DANA
--------	----------------	----------	--------

U USEVIMA KUPUSA NAMENJENIH ZA LETNJU PROIZVODNJU PREPORUČUJE SE PRIMENA INSEKTICIDA:

PREPARAT	AKTIVNA MATERIJA	DOZA	KARENCA
CIPKORD 20 EC, NOTIKOR, CRNA MAMBA	CIPERMETRIN	0,3 L/HA	28 DANA

**U USEVIMA KOJI SU U FAZI BERBE, NE TREBA PRIMENJIVATI HEMIJSKE MERE ZAŠTITE!**

.....  
 POŠTOVANI POLJOPRIVREDNI PROIZVOĐAČI I POŠTOVANI GLEDAOCI, DETALJNIJE INFORMACIJE O POJAVI ŠTETNIH ORGANIZAMA I MERAMA KONTROLE MOŽETE POGLEDATI NA SAJTU PROGNOZNO IZVEŠTAJNE SLUŽBE ZAŠTITE BILJA VOJVODINE [WWW.PISVOJVODINA.COM](http://WWW.PISVOJVODINA.COM)