

POŠTOVANI POLJOPRIVREDNI PROIZVOĐAČI I DRAGI GLEDAOCI DOBRO DOŠLI U „ZELENU PROGNOZU“  
DANAS VAS INFORMIŠEMO O STANJU U ZASADIMA ŠLJIVA

---

## FENOFAZE ŠLJIVA

NA PODRUČJU VOJVODINE U TOKU JE BERBA RANHI SORTI ŠLJIVA, DOK SE SREDNJE I KASNE SORTE NALAZE U FAZI OD PLODOVI DOSTIGLI 70% KRAJNJE VELIČINE DO POČETKA OBOJAVANJA PLODA.



SLIKA 1. FAZA RAZVOJA ŠLJIVE

### ŠLJIVIN SMOTAVAC (*Grapholita funebrana*)

ŠLJIVIN SMOTAVAC JE NAJZNAČAJNIJA ŠTETOČINA ŠLJIVE KOJA U NAŠIM PROIZVODNIM USLOVIMA RAZVIJA TRI GENERACIJE GODIŠNJE.

ŠTETE PRIČINJAVAJU LARVE KOJE SE HRANE MESOM PLODA. NAPADNUTI PLODOVI SE PREPOZNAJU PO SMOLOTOČINI KOJA CURI IZ NJIH, PO TAMNIM HODNICIMA U KOJIMA SE NALAZI GUSENIČNI IZMET I PO TOME ŠTO DOLAZI DO PREVREMENOG SAZREVANJA I OPADANJA PLODOVA.




SLIKA 2. CURENJE SMOLE IZ NAPADNUTOG PLODA ŠLJIVE

VIZUELNIM PREGLEDIMA ZASADA ŠLJIVA REGISTROVANA SU JAJA OVE ŠTETOČINE U RAZLIČITIM FAZAMA RAZVOJA KAO I ISPILJENE LARVE. U TOKU JE PERIOD INTENZIVNOG PILJENJA LARVI DRUGE GENERACIJE ŠLJIVINOG SMOTAVCA.



SLIKA 3. JAJE ŠLJIVINOG SMOTAVCA NA PLODU



SLIKA 4. JAJE ŠLJIVINOG SMOTAVCA NA PLODU

## PREPORUKA

U CILJU ZAŠTITE PLODOVA ŠLJIVA OD UBUŠIVANJA LARVI ŠLJIVINOG SMOTAVCA PREPORUČUJE SE PRIMENA REGISTROVANOG INSEKTICIDA:

PREPARAT	AKTIVNA MATERIJA	KONCENTRACIJA
GROM	LAMBDA-CIHALOTRIN	0,03%

PRILIKOM HEMIJSKE ZAŠTITE STROGO VODITI RAČUNA O KARENCI PRIMENJENIH PREPARATA KOJA ZA NAVEDENI INSEKTICID IZNOSI 14 DANA.

### PROUZROKOVAČI TRULEŽI PLODOVA (*Monilinia* spp.)

U OVOJ PROIZVODNOJ GODINI REGISTRUJU SU USLOVI KOJI SU IZUZETNO POVOLJNI ZA RAZVOJ GLJIVA IZ RODA MONILINIA KOJE PROUZROKUJU TRULEŽ PLODOVA. U FAZAMA SAZREVANJA PLODOVA, KADA DOLAZI DO OMEKŠAVANJA POKOŽICE PLODA, NAJVEĆI JE RIZIK OD OSTVARENJA INFEKCIJA OVIM PATOGENIMA. RIZIK SE POVEĆAVA UKOLIKO DOĐE DO MEHANIČKIH OŠTEĆENJA NA PLODOVIMA KADA JE OLAKŠAN PRODOR PATOGENA U TKIVO PLODA. MEHANIČKA OŠTEĆENJA MOGU NASTATI USLED DELOVANJA INSEKATA, VETRA, GRADA I DR.

PLODOVI ZARAŽENI SA GLJIVAMA IZ RODA MONILINIA MOGU BITI I OGRANIČAVAJUĆI FAKTOR PRILIKOM IZVOZA NAŠEG VOĆA NA STRANA TRŽIŠTA. JEDNA OD GLJIVA IZ GRUPE PROUZROKOVAČA TRULEŽI IMA KARANTINSKI STATUS U NEKIM ZEMLJAMA GDE SE IZVOZI NAŠE VOĆE, TE SE POSEBAN OPREZ PREPORUČUJE PROIZVOĐAČIMA KOJI SU ORIJENTISANI KA IZVOZU.



SLIKA 4. SIMPTOMI TRULEŽI NA PLODOVIMA ŠLJIVE

U ZASADIMA ŠLJIVA KOJI SU U POČETNIM FAZAMA SAZREVANJA, PREPORUČUJE SE PRIMENA FUNGICIDA:

PREPARAT	AKTIVNA MATERIJA	DOZA
CIPRODEX	CIPRODINIL	0,05%

PRILIKOM HEMIJSKE ZAŠTITE STROGO VODITI RAČUNA O KARENCI PRIMENJENIH PREPARATA KOJA ZA NAVEDENI FUNGICID IZNOSI 14 DANA.

.....  
POŠTOVANI POLJOPRIVREDNI PROIZVOĐAČI I POŠTOVANI GLEDAOCI, DETALJNIJE INFORMACIJE O POJAVI ŠTETNIH ORGANIZAMA I MERAMA KONTROLE MOŽETE POGLEDATI NA SAJTU PROGNOZNO IZVEŠTAJNE SLUŽBE ZAŠTITE BILJA VOJVODINE [WWW.PISVOJVODINA.COM](http://WWW.PISVOJVODINA.COM)