

**BILJNA VRSTA:** JABUKA

**ŠTETNI ORGANIZMI:** JABUKIN SMOTAVAC, GRINJE, PEPELNICA JABUKE

NA PODRUČJU AP VOJVODINE JABUKE SE U ZAVISNOSTI OD LOKALITETA I SORTIMENTA NALAZE U RAZLIČITIM FAZAMA RAZVOJA PLODA.

U JABUČNJACIMA JE U TOKU LET LEPTIRA I POČETAK POLAGANJA JAJA DRUGE GENERACIJE **JABUKINOG SMOTAVCA**. TO JE EKONOMSKI NAJZNAČAJNIJA ŠTETOČINA JABUKE KOD NAS KOJA MOŽE NAPRAVITI VELIKE ŠTETE UKOLIKO SE NE SUZBIJA.

ŠTETE PRIČINJAVAJU LARVE KOJE SE UBUŠUJU U PLODOVE I ISHRANJUJU MESOM PLODA I SEMENKAMA. NA MESTU UBUŠIVANJA U PLOD, LARVA IZBACUJE CRVENKASTI IZMET. NA PRESEKU PLODA VIDI SE HODNIK KOJI VODI DO SEMENE KUĆICE. NAPADNUTI PLODOVI GUBE TRŽIŠNU VREDNOST, IMAJU SMANJENU MOGUĆNOST ČUVANJA JER SU PODLOŽNI TRULJENJU I PREVREMENO OPADAJU.

**PREPORUKA:** SA CILJEM SPREČAVANJA UBUŠIVANJA LARVI SMOTAVCA U PLODOVE, NA POČETKU POLAGANJA JAJA MOGUĆA JE PRIMENA REGISTROVANIH INSEKTICIDA IZ GRUPE REGULATORA RASTA I RAZVIĆA INSEKATA:

PREPARAT	AKTIVNA MATERIJA	DOZA / KONCENTRACIJA
HARPUN, LASCAR, PRINCE, UPAXIAL	PIRIPROKSIFEN	0,075-0,1%
NEXIRAM 10 EC		0,1%
ALKAZAR		0,075-0,125 L/HA

VIZUELNIM PREGLEDIMA, U POJEDINIM ZASADIMA JABUKE UOČENO JE PRISUSTVO **GRINJA**. TRENUTNI USLOVI U PROIZVODNJI, PRAĆENI VISOKIM TEMPERATURAMA, POGODUJU RAZVOJU I ŠIRENJU OVIH ŠTETOČINA. ZASADE JABUKA TREBA REDOVNO OBILAZITI I PREGLEDATI NA PRISUSTVO OVIH ŠTETOČINA. UKOLIKO SE REGISTRUJE NJIHOVO PRISUSTVO PREPORUČUJE SE PRIMENA NEKOG OD REGISTROVANIH AKARICIDA:

PREPARAT	AKTIVNA MATERIJA	DOZA/KONCENTRACIJA
AMON 020 EW, ABASTATE ME, ABASTATE EW, KRAFT 1,8 EW, ABASTATE, ABASTATE S, AKARISTOP	ABAMEKTIN	0,075-0,1%

USLOVI U PROIZVODNJI POGODUJU RAZVOJU I ŠIRENJU PROUZROKOVAČA PEPELNICE JABUKE. PROIZVOĐAČIMA SE PREPORUČUJE NASTAVAK ZAŠTITE JABUKE OD TOG PATOGENA, PRIMENOM NEKOG OD REGISTROVANIH FUNGICIDA:


PREPARAT	AKTIVNA MATERIJA	KONCENTRACIJA
IMPACT 125 EC, IMPERIUM	FLUTRIAFOL	0,015-0,02%
RIZA 250 EC	TEBUKONAZOL	0,03%
TOPAS 100 EC	PENKONAZOL	0,04%
EMBRELIA 140 SC	IZOPIRAZAM+DIFENOKONAZOL	0,1%

**ZBOG VISOKIH DNEVNIH TEMPERATURA SPROVOĐENJE HEMIJSKIH MERA ZAŠTITE SE PREPORUČUJE U VEČERNJIM ČASOVIMA.**

DETALJNIJE INFORMACIJE O POJAVI ŠTETNIH ORGANIZAMA I MERAMA NJIHOVE KONTROLE MOGU SE POGLEDATI NA PORTALU PROGNOZNO IZVEŠTAJNE SLUŽBE ZAŠTITE BILJA VOJVODINE [WWW.PISVOJVODINA.COM](http://WWW.PISVOJVODINA.COM)



SLIKA 1. FAZA RAZVOJA JABUKE



SLIKA 2. SVEŽE POLOŽENO JAJE JABUKINOG SMOTAVCA



SLIKA 3. LARVA JABUKINOG SMOTAVCA



SLIKA 4. ŠTETE NA PLODOVIMA OD JABUKINOG SONTAVCA



SLIKA 5. ŠTETE NA PLODOVIMA OD JABUKINOG SONTAVCA



SLIKA 6. GRINJE NA NALIČJU LISTA JABUKE



SLIKA 7. SIMPTOM PEPELNICE JABUKE