

POŠTOVANI POLJOPRIVREDNI PROIZVOĐAČI I DRAGI GLEDAOCI DOBRO DOŠLI U „ZELENU PROGNOZU“

DANAS VAS INFORMIŠEMO O AKTUELNIM MERAMA ZAŠTITE ŠEĆERNE REPE OD REPINE PIPE

.....

NA PODRUČJU VOJVODINE USEVI ŠEĆERNE REPE SE NALAZE U FAZI OD KLIJANJA I NICANJA DO FAZE RAZVOJA PRVIH LISTOVA. TRENUTNE FAZE RAZVOJA SU I NAJOSETLJIVIJE NA NAPAD REPINE PIPE. SAMO U TOKU JEDNOG DANA, JEDAN INSEKT MOŽE DA OŠTETI 15-16 BILJČICA STARIH JEDAN DAN I OD 8 DO 10 BILJČICA STARIH DVA DANA. ZATO SE SMATRA DA JE REPINA PIPA EKONOMSKI NAJZNAČAJNIJA ŠTETOČINA REPE U NAŠIM PROIZVODNIM USLOVIMA.

OVA ŠTETOČINA SE U SISTEMU PROGNOZNO-IZVEŠTAJNE SLUŽBE ZAŠTITE BILJA VOJVODINE PRATI POMOĆU FEROMONSKIH KLOPKI I REDOVNIH PREGLEDA U POLJU. PORED POVEĆANJA BROJA ULOVLJENIH JEDINKI NA KLOPKAMA NA STARIM REPIŠTIMA, PRISUSTVO ODRASLIH JEDINKI SE REGISTRUJE I NA NOVOPOSEJANIM REPIŠTIMA. KADA IZAĐU SA MESTA PREZIMLJAVANJA, NA STARIM REPIŠTIMA, ODRASLE JEDINKE HODAJU, NE LETE. MEĐUTIM SA PORASTOM TEMPERATURE VAZDUHA PERKO 20 °C POČINJE LET PIPE U POTRAZI ZA HRANOM, ODNOSNO NOVIM REPIŠTIMA. S OBZIROM DA SE U NAREDNOM PERIODU PROGNOZIRAJU VISOKE DNEVNE TEMPERATURE VAZDUHA PREKO 20 °C MOŽE SE OČEKIVATI LET REPINE PIPE KA NOVIM REPIŠTIMA. NAJUGROŽENIJI SU USEVI U BLIZINI PROŠLOGODIŠNJIH REPIŠTA.

PREPORUKA

PROIZVOĐAČIMA SE PREPORUČUJU REDOVNI OBILASCI NOVIH REPIŠTA, U NAJTOPLIJEM DELU DANA KADA SU PIPE NAJAKTIVNIJE, RADI UTVRĐIVANJA NJIHOVOG PRISUSTVA. UKOLIKO SE REGITRUJE OD 0,1 DO 0,3 ODRASLE JEDINKE REPINE PIPE PO M² PREPORUČUJE SE SPROVOĐENJE HEMIJSKIH MERA ZAŠTITE NEKIM OD REGISTROVANIH INSEKTICIDA:

PREPARAT	AKTIVNA MATERIJA	DOZA
CIPKORD 20-EC, CRNA MAMBA, CIPRAZOR 20 EC	CIPERMETRIN	0,15 – 0,3 L/HA
FASTAC 10 EC, FASKORD EC	ALFA-CIPERMETRIN	0,2 -0,3 L/HA
KARATE ZEON, KOZAK	LAMBDA-CIHALOTRIN	0,2 L/HA
GROM	LAMBDA-CIHALOTRIN	0,2-0,3 L/HA

TAKOĐE, NA USEVIMA ŠEĆERNE REPE JE UOČENO I PRISUSTVO KUKURUZNE PIPE I PEŠČARA, INSEKATA KOJI ISTO KAO I REPINA PIPA MOGU SVOJOM ISHRANOM NANETI VELIKE ŠTETE U POČETNIM FAZAMA RAZVOJA USEVA. NAVEDENI INSEKTICIDI DELOVAĆE I NA SUZBIJANJE TIH ŠTETOČINA.




SLIKA 1. FAZA RAZVOJA ŠEĆERNE REPE



SLIKA 2. ODRASLA JEDINKA REPINE PIPE




SLIKA 3. ODRASLE JEDINKE REPINE PIPE U FEROMONSKOJ KLOPCI



SLIKA 3. REPINA PIPA U TOKI ISHRANE NA BILJCI ŠEĆERNE REPE



SLIKA 4. ODRASLA JEDINKA KUKURUZNE PIPE



SLIKA 5. ODRASLA JEDINKE PEŠČARA

.....
POŠTOVANI POLJOPRIVREDNI PROIZVOĐAČI I DRAGI GLEDAOCI, DETALJNIJE INFORMACIJE O
POJAVI ŠTETNIH ORGANIZAMA I MERAMA KONTROLE MOŽETE POGLEDATI NA SAJTU
PROGNOZNO IZVEŠTAJNE SLUŽBE ZAŠTITE BILJA VOJVODINE WWW.PISVOJVODINA.COM