

BILJNA VRSTA: BOROVNICA

ŠTETNI ORGANIZMI: UVENUĆE I SUŠENJE CVETOVA I IZDANAKA I SIVA TRULEŽ

NA PODRUČJU VOJVODINE ZASADI BOROVNICE SE NALAZE U FAZI POČETKA CVETANJA.

U PERIODU CVETANJA I U USLOVIMA VISOKE VLAŽNOSTI, BOROVNICA JE OSETLJIVA NA INFEKCIJU PATOGENOM KOJI PROUZROKUJE UVENUĆE I SUŠENJE CVETOVA I IZDANAKA. OVAJ PATOGEN PREZIMLJAVA U OPALIM MUMIFICIRANIM PLODOVIMA BOROVNICE. NA PROLEĆE, SA PORASTOM TEMPERATURA I U USLOVIMA VLAŽNOSTI MOŽE DOĆI DO INFEKCIJE MLADIH LISTOVA, IZDANAKA I CVETOVA. NA ZARAŽENIM LISTOVIMA JAVLJAJU SE BRAON PEGE DUŽ GLAVNOG NERVA. ŠIRENJE BOLESTI DOLAZI DO SUŠENJA LISTOVA I CELIH IZDANAKA KOJI SE SAVIJAJU U VIDU PASTIRSKOG ŠTAPA. ZARAŽENI CVETOV I POPRIMAJU BRAON BOJU, A TKIVO U OSNOVI CVETOVA POSTAJE VODENASTO.

U FAZAMA CVETANJA, BOROVNICE SU TAKOĐE IZUZETNO OSETLJIVE I NA INFEKCIJU PATOGENOM KOJI PROUZROKUJE SIVU TRULEŽ. OVAJ PATOGEN PREZIMLJAVA U ZARAŽENIM BILJNIM OSTACIMA I NA PROLEĆE U VLAŽNIM USLOVIMA MOŽE DOĆI DO INFEKCIJE IZDANAKA, CVETOVA I PLODOVA. SIMPTOMI SE UOČAVAJU U VIDU PALEŽI CVETOVA, ALI I TRULEŽI PLODOVA. PALEŽ MOŽE ZAHVATITI I LISTOVE I IZDANKE.

PREPORUKA: UKOLIKO SU U PERIODU CVETANJA BOROVNICE NAJAVLJENE PADAVINE, PREPORUKA JE PREVENTIVNA PRIMENA NEKOG OD REGISTROVANIH FUNGICIDA SA CILJEM ZAŠTITE BILJAKA OD PATOGENA KOJI PROUZROKUJU UVENUĆE I PALEŽ:

PREPARAT	AKTIVNA MATERIJA	DOZA
ATLAS, SWITCH 62,5 WG	CIPRODINIL+FLUDIOKSONIL	1 KG/HA
LUNA SENSATION	FLUOPIRAM+TRIFLOKSISTROBIN	0,6 L/HA

PRIMENA INSEKTICIDA U FAZAMA CVETANJA VOĆA JE ZABRANJENA!

DETALJNIJE INFORMACIJE O ŠTETNIM ORGANIZMIMA I MERAMA NJIHOVE KONTROLE MOŽETE POGLEDATI NA PORTALU PROGNOZNO-IZVEŠTAJNE SLUŽBE ZA ZAŠTITU BILJA AP VOJVODINE.



SLIKA 1. POČETAK CVETANJA BOROVNICE



SLIKA 2. SIMPTOMI UVENUĆA



SLIKA 3. SIMPTOMI UVENUĆA



SLIKA 4. SIMPTOM SIVE TRULEŽI NA CVETOVIMA BOROVNICE (IZVOR:EPPO)



SLIKA 5. SIMPTOM SIVE TRULEŽI NA CVETOVIMA BOROVNICE (IZVOR:EPPO)