

POŠTOVANI POLJOPRIVREDNI PROIZVOĐAČI I DRAGI GLEDAOCI DOBRO DOŠLI U „ZELENU PROGNOZU“
DANAS VAS INFORMIŠEMO O STANJU U ZASADIMA ŠLJIVA

FAZE RAZVOJA ŠLJIVE

NA PODRUČJU VOJVODINE ŠLJIVE SE U ZAVISNOSTI OD SORTIMENTA I LOKALITETA NALAZE U RAZLIČITIM FAZAMA RAZVOJA PLODA: OD FAZE ZELEN I PLODNIK OKRUŽEN SASUŠENOM CVETNOM LOŽOM DO FAZE DRUGO OPADANJE PLODOVA.



SLIKA 1. FAZA RAZVOJA ŠLJIVE

STANJE U ZASADIMA ŠLJIVA

NA PODRUČJU VOJVODINE U TOKU JE POLAGANJE JAJA PRVE GENERACIJE ŠLJIVINOG SMOTAVCA (*Grapholita funebrana*). U REGIONIMA KIKINDE, NOVOG SADA, RUME, SENTE I ZRENJANINA ZAPOČELO JE I PILJENJE LARVI PRVE GENERACIJE OVE ŠTETOČINE, DOK SE U OSTALIM REGIONIMA OVAJ BIOLOŠKI DOGAĐAJ OČEKUJE U NAREDNIM DANIMA.

ŠLJIVIN SMOTAVAC JE NAJZNAČAJNIJA ŠTETOČINA ŠLJIVE. U NAŠIM PROIZVODNIM USLOVIMA RAZVIJA TRI GENERACIJE GODIŠNJE. ŽENKA POLAŽE JAJA NAJČEŠĆE NA PLODOVE ILI LISTOVE U BLIZINI PLODOVA. NAKON IZLASKA IZ JAJETA, LARVA PRAVI ULAZNI OTVOR I UVLAČI SE U UNUTRAŠNJOST PLODA. LARVE PRIČINJAVAJU ŠTETE ISHRANJUJUĆI SE MESOM PLODA, A TAKO NAPADNUTI PLODOVI SE PREPOZNAJU PO SMOLOTOČINI KOJA CURI IZ NJIH.

INFESTIRANI PLODOVI PRESTAJU DA POVEĆAVAJU SVOJ VOLUMEN, ČESTO DOBIJAJU LJUBIČASTU BOJU, PREVREMENO SAZREVAJU I OTPADAJU.



SLIKA 2. JAJA ŠLJIVINOG SMOTAVCA NA MLADIM PLODOVIMA



SLIKA 3. LARVA ŠLJIVINOG SMOTAVCA UNUTAR PLODA ŠLJIVE

TREKUTNO SE U ZASADIMA ŠLJIVA REGISTRUJE PRISUSTVO ŠLJIVINE VAŠI KOVRDŽALICE (*Brachycaudus helichrysi*), ŠLJIVINE BRAŠNJAVE VAŠI (*Hyalopterus pruni*) I DRUGIH LISNIH VAŠI.

LISNE VAŠI NANOSE ŠTETE SISAJUĆI SOKOVE BILJAKA NA NALIČJU LIŠĆA I VRHOVIMA MLADIH LASTARA. NAPADNUTO LIŠĆE SE UVIJA, A LASTARI ZAOSTAJU U PORASTU. JAK NAPAD IZAZIVA SLABLJENJE ČITAVE VOĆKE, ŠTO SE NEPOVOLJNO ODRAŽAVA NA PORAST I SAZREVANJE PLODOVA.



SLIKA 4. LISNE VAŠI NA LISTU I PLODU ŠLJIVE



SLIKA 5. SIMPTOM NAPADA VAŠI

PREPORUKA

U CILJU SPREČAVANJA UBUŠIVANJA LARVI ŠLJIVINOG SMOTAVCA U PLODOVE I SUZBIJANJA LISNIH VAŠI, PROIZVOĐAČIMA SE PREPORUČUJU HEMIJSKE MERE ZAŠTITE REGISTROVANIM INSEKTICIDOM:

PREPARAT	AKTIVNA MATERIJA	KONCENTRACIJA
TONUS EKSTRA	ACETAMIPRID	0,02-0,025%

USLOVI U KOJIMA SE ODVIJA PROIZVODNJA, NESTABILNE VREMENSKE PRILIKE SA PADAVINAMA, MOGU STVORITI POVOLJNE USLOVE ZA INFKECIJU LISNE MASE GLJIVAMA PROUZROKOVAČIMA ŠUPLJIKAVOSTI LIŠĆA KOŠTIČAVOG VOĆA (*Stigmia carpophila*) I PLAMENJAČE ŠLJIVE (*Polystigma rubrum*).



SLIKA 6. SIMPTOM ŠUPLJIKAVOSTI NA LISTU ŠLJIVE



SLIKA 7. SIMPTOM PLAMENJAČE ŠLJIVE

U CILJU ZAŠTITE LISNE MASE OD NAVEDENIH PATOGENA PROIZVOĐAČIMA SE PREPORUČUJE PRIMENA NEKOG OD NAVEDENIH FUNGICIDA:

PREPARAT	AKTIVNA MATERIJA	KONCENTRACIJA
MERPAN 50 WP, CAPTAN 50 WP, VENTURION, MERPAN 48 SC, METHOD 48 SC, CAPI	KAPTAN	0,2-0,3%

.....
POŠTOVANI POLJOPRIVREDNI PROIZVOĐAČI I POŠTOVANI GLEDAOCI, DETALJNIJE INFORMACIJE O POJAVI ŠTETNIH ORGANIZAMA I MERAMA KONTROLE MOŽETE POGLEDATI NA SAJTU PROGNOZNO IZVEŠTAJNE SLUŽBE ZAŠTITE BILJA VOJVODINE WWW.PISVOJVODINA.COM