

POŠTOVANI POLJOPRIVREDNI PROIZVOĐAČI I DRAGI GLEDAOCI DOBRO DOŠLI U „ZELENU PROGNOZU“

DANAS VAS INFORMIŠEMO O ZDRAVSTVENOM STANJU USEVA PŠENICE I POTREBI SPROVOĐENJA MERA ZAŠTITE NAKON STABILIZACIJE VREMENSKIH USLOVA

FENOFAZE RAZVOJA PŠENICE

NA PODRUČJU VOJVODINE, NAJVEĆI BROJ PARCELA POD PŠENICOM NALAZI SE U FAZI VLATANJA, FORMIRANO DRUGO KOLENCE.



SLIKA 1. USEV PŠENICE

U VIZUELNIM PREGLEDIMA USEVA PŠENICE REGISTROVANO JE PRISUSTVO SIMPTOMA SLEDEĆIH BOLESTI:


- SIVE PEGAVOSTI LISTA PŠENICE (*Septoria tritici*)
- ŽUTO-MRKE PEGAVOSTI (*Pyrenophora tritici-repentis*)
- PEPELNICE ŽITA (*Erysiphe graminis*)
- LISNE RĐE (*Puccinia triticina*)



SLIKA 2. SIMPTOM SIVE PEGAVOSTI LISTA PŠENICE



SLIKA 3. SIMPTOM SIVE PEGAVOSTI LISTA PŠENICE



SLIKA 4. SIMPTOM ŽUTO-MRKE PEGAVOSTI



SLIKA 5. SIMPTOM LISNE RĐE



SLIKA 6. SIMPTOM PEPELNICE ŽITA

VIZUELNIM PREGLEDOM BILJAKA PRE OVOG ZAHLAĐENJA PRAĆENOG KIŠOM, REGISTROVANO JE PRISUSTVO SIMPTOMA BOLESTI NA GOTOVO SVIM USEVIMA PŠENICE, A INTENZITET PRISUSTVA SIMPTOMA ZAVISI OD REGIONA, SORTIMENTA, FAZE RAZVOJA PŠENICE, GUSTINE USEVA I DRUGIH FAKTORA. PRISUTNA VISOKA VLAŽNOST I POVEĆANJE TEMPERATURA KOJE SE NAJAVLJUJE ZA NAREDNI PERIOD POVOLJNO ĆE UTICATI NA RAZVOJ I ŠIRENJE BOLESTI PŠENICE.

PREPORUKA

SISTEM PROGNOZNO-IZVEŠTAJNE SLUŽBE ZAŠTITE BILJA AP VOJVODINE JE DAO PREPORUKU ZA SUZBIJANJE BOLESTI U USEVIMA PŠENICE PRE NEDELJU DANA ZA USEVE IZ OPTIMALNIH ROKOVA SETVE KOJI SU TADA ULAZILI U FAZU VLATANJA.

MEĐUTIM, OVONEDELJNE VREMENSKE PRILIKE PRAĆENE KIŠOM I PADOM TEMPERATURA ONEMOGUĆILE SU SPROVOĐENJE HEMIJSKIH MERA ZAŠTITE NA VEĆINI USEVA PŠENICE.

VEOMA JE VAŽNO JE DA SE ODMAH PO STABILIZACIJI VREMENSKIH PRILIKA IZVRŠI ZAŠTITA USEVA PŠENICE OD BOLESTI LISTA I STABLA KAKO BI SE OČUVALO ZDRAVLJE BILJA I OMOGUĆILA STABILNA PROIZVODNJA OVE VEOMA VAŽNE STRATEŠKE KULTURE.

ČIM VREMENSKI USLOVI DOZVOLE, PROIZVOĐAČIMA KOJI DO SADA NISU SPROVELI HEMIJSKE MERE ZEŠTITE SE PREPORUČUJE PREGLED USEVA U CILJU UTVRĐIVANJA

PRISUSTVA SIMPTOMA BOLESTI I FAZE RAZVOJA USEVA. UKOLIKO SE PREGLEDOM PŠENICE UTVRDE SIMPTOMI BOLESTI NA PREKO 10% BILJAKA U FAZI VLATANJA, PREPORUČUJE SE PRIMENA NEKOG OD REGISTROVANIH FUNGICIDA:

PREPARAT	AKTIVNA MATERIJA	DOZA
DUETT ULTRA	EPOSIKONAZOL + TIOFANAT METIL	0,4 – 0,6 L/HA
AMISTAR EXTRA	AZOKSISTROBIN + CIPROKONAZOL	0,5 – 0,75 L/HA
TEATAR PLUS	AZOKSISTROBIN + DIFENOKONAZOL	0,6 – 1 L/HA
ANTRE PLUS	TEBUKONAZOL + TIOFANAT METIL	1,5 L/HA
OPERA MAX	PIRAKLOSTROBIN + EPOSIKONAZOL	1,2 – 2 L/HA
FALCON FORTE	SPIROKSAMIN+TEBUKONAZOL+PROTIKONAZOL	0,7 – 1 L/HA
OSIRIS	EPOSIKONAZOL+METKONAZOL	1,5 – 2,5 L/HA
PRIAXOR EC	FLUKSAPIROKSAD+PIRAKLOSTROBIN	0,75 – 1,5 L/HA
ASCRA XPRO	BIKSAFEN+FLUOPIRAM+PROTIKONAZOL	0,9 – 1,2 L/HA

ILI NEKI DRUGI REGISTROVANI FUNGICID.

HEMIJSKE MERE ZAŠTITE TREBA SPROVESTI KADA TEMPERATURA VAZDUHA DOSTIGNE 15°C ZBOG EFIKASNIJEG DELOVANJA FUNGICIDA.

.....
POŠTOVANI POLJOPRIVREDNI PROIZVOĐAČI I DRAGI GLEDAOCI, DETALJNIJE INFORMACIJE O POJAVI ŠTETNIH ORGANIZAMA I MERAMA KONTROLE MOŽETE POGLEDATI NA SAJTU PROGNOZNO IZVEŠTAJNE SLUŽBE ZAŠTITE BILJA VOJVODINE WWW.PISVOJVODINA.COM