

## Zelena prognoza za 15.7.2019 - O STANJU U USEVIMA ŠEĆERNE REPE

### FAZE ŠEĆERNE REPE

NA PODRUČJU VOJVODINE USEVI ŠEĆERNE REPE SE NALAZE U FAZI RAZVIĆA KORENA.



SLIKA 1. USEV ŠEĆERNE REPE

### PEGAVOST LISTA ŠEĆERNE REPE (*Cercospora beticola*)

PEGAVOST LISTA ŠEĆERNE REPE SE JAVLJA SVAKE GODINE NA NAŠEM PROIZVODNOM PODRUČJU I UTIČE NA PRINOS KORENA I SADRŽAJ ŠEĆERA.

VIZUELNIM PREGLEDIMA USEVA ŠEĆERNE REPE REGISTRUJE SE RAZLIČIT NIVO PRISUSTVA SIMPTOMA PEGAVOSTI LIŠĆA ŠEĆERNE REPE U ZAVISNOSTI OD SORTIMENTA, ROKA SETVE, UČESTALOSTI GAJENJA REPE, PRETHODNO SPROVEDENIH HEMIJSKIH MERA ZAŠTITE, LOKALITETA I DR.

NA AUTOMATSKIM METEOROLOŠKIM STANICAMA POSTAVLJENIM U USEVIMA REPE KONSTANTNO SE REGISTRUJU POVOLJNI USLOVI ZA RAZVOJ OVOG PATOGENA. U USEVIMA GDE JE POSTIGNUT DRUGI EPIDEMIJSKI PRAG U POSLEDNJOJ NEDELJI JUNA, UOČENO JE DALJE ŠIRENJE SIMPTOMA PEGAVOSTI LIŠĆA ŠEĆERNE REPE. PEGE SU PRISUTNE KAKO NA STARIJEM TAKO I NA MLADOM LIŠĆU.



SLIKA 2. SIMPTOM PEGAVOSTI LISTA ŠEĆERNE REPE



SLIKA 3. SIMPTOM PEGAVOSTI LISTA ŠEĆERNE REPE



SLIKA 4. SIMPTOM PEGAVOSTI LISTA ŠEĆERNE REPE

## PREPORUKA

U CILJU OČUVANJA LISNE MASE, PREPORUČUJE SE PRIMENA KOMBINACIJE FUNGICIDA KONTAKTNOG I SISTEMIČNOG MEHANIZMA DELOVANJA:

PREPARATI	AKTIVNA MATERIJA	DOZA
BRAVO 720 SC, DAKOFLO, BALEAR 720 SC	HLOTOTALONIL	1,5 L/HA
+ BUMPER P	+ PROHLORAZ+PROPIKONAZOL	0,8-1 L/HA