

POŠTOVANI POLJOPRIVREDNI PROIZVOĐAČI I DRAGI GLEDAOCI DOBRO DOŠLI U „ZELENU PROGNOZU“

DANAS VAS INFORMIŠEMO O STANJU U ZASADIMA JABUKA I AKTUELNIM MERAMA ZAŠTITE

.....

NA PODRUČJU VOJVODINE JABUKE SE NALAZE U FAZI RAZVOJA PLODA, PLODOVI SU DOSTIGLI 40 DO 50% KRAJNJE VELIČINE.

JABUKIN SMOTAVAC JE NAJZNAČAJNIJA ŠTETOČINA JABUKE I JAVLJA SE SVAKE GODINE U GOTOVO SVAKOM ZASADU. ŠTETE PRIČINJAVAJU LARVE KOJE SE UBUŠUJU U PLODOVE KOJI PREVEREMNEO OPADAJU.

NA PODRUČJU VOJVODINE U TOKU JE PILJENJE LARVI PRVE GENERACIJE OVE ŠTETOČINE. NA PLODOVIMA I LISTOVIMA JE UOČENO PRISUSTVO JAJA U SVIM FAZAMA RAZVOJA, TE JE PREPORUKA DA SE IZVRŠI ZAŠTITA JABUKA SA NEKIM OD REGISTROVANIH INSEKTICIDA:

PREPARAT	AKTIVNA MATERIJA	KONCENTRACIJA
IMIDAN	FOSMET	0,15-0,2 %
MOSPILAN 20 SG, ZLATOSPILAN, TONUS, VOLLEY 20 SP, AFINEX, KESTREL, WIZZZAARD	ACETAMIPRID	0,025 %

PREGLEDIMA ZASADA JABUKA UOČENO JE I PRISUSTVO GRINJA NA NALIČJU LISTOVA. U NAŠIM USLOVIMA, JABUKU NAPADA NEKOLIKO VRSTA: OBIČNI PAUČINAR, CRVENA VOĆNA GRINJA I RĐASTA GRINJA.

TRENTNI USLOVI U PROIZVODNJI, PRAĆENI VISOKIM TEMPERATURAMA, POGODUJU RAZVOJU I ŠIRENJU OVIH ŠTETOČINA. ZASADE JABUKA TREBA REDOVNO OBILAZITI I PREGLEDATI NA PRISUSTVO GRINJA I PO POTVRDI NJIHOVOG PRISUSTVA IZVRŠITI MERE ZAŠTITE NEKIM OD REGISTROVANIH AKARICIDA:

PREPARAT	AKTIVNA MATERIJA	DOZA/KONCENTRACIJA
AMON 020 EW, ABASTATE ME, ABASTATE EW, KRAFT 1,8 EW, ABASTATE, ABASTATE S, AKARISTOP	ABAMEKTIN	0,075-0,1%
URANUS	ETOKSAZOL	0,5 L/HA
BORNEO		0,375-0,625 L/HA

USLOVI U PROIZVODNJI POGODUJU RAZVOJU I ŠIRENJU PROUZROKOVAČA PEPELNICE JABUKE. PERIOD PRIMARNIH ZARAŽA OD PROUZROKOVAČA ČAĐAVE PEGAVOSTI LISTA I KRSTAVOSTI PLODA JABUKE JE ZAVRŠEN I ZAŠTITU OD OVOG PATOGENA TREBA NASTAVITI SAMO U ZASADIMA GDE IMA SIMPTOMA. ZA ZAŠTITU OD PROUZROKOVAČA BOLESTI, PREDLAŽE SE PRIMENA NEKOG OD SLEDEĆIH FUNGICIDA:

PREPARAT	AKTIVNA MATERIJA	KONCENTRACIJA/DOZA
LUNA EXPERIENCE	TEBUKONAZOL+ FLUOPIRAM	0,075%
SERCADIS PLUS	FLUKSAPIROKSAD+DIFENOKONAZOL	1,2 L/HA

SPROVOĐENJE HEMIJSKIH MERA ZAŠTITE SE PREPORUČUJE U VEČERNJIM ČASOVIMA ZBOG VISOKIH DNEVNIH TEMPERATURA VAZDUHA.



SLIKA 1. FAZA RAZVOJA JABUKE



SLIKA 2. LARVA JABUKINOG SMOTAVCA U PLODU JABUKE



SLIKA 3. LARVA JABUKINOG SMOTAVCA U PLODU JABUKE



SLIKA 4. SIMPTOM NAPADA RĐASTE GRINJE NA JABUCI



SLIKA 5. RĐASTA GRINJA NA LISTU JABUKE



SLIKA 6. SIMPTOM NAPADA CRVENOG VOĆNOG PAUKA



SLIKA 7. SIMPTOM PEPELNICE

.....  
POŠTOVANI POLJOPRIVREDNI PROIZVOĐAČI I POŠTOVANI GLEDAOCI, DETALJNIJE  
INFORMACIJE O POJAVI ŠTETNIH ORGANIZAMA I MERAMA KONTROLE MOŽETE POGLEDATI  
NA SAJTU PROGNOZNO IZVEŠTAJNE SLUŽBE ZAŠTITE BILJA VOJVODINE  
[WWW.PISVOJVODINA.COM](http://WWW.PISVOJVODINA.COM)