

Zelena prognoza za 16.7.2018. - O problemima u proizvodnji paprike

NA TERITORIJI VOJVODINE OD 2015. GODINE REGISTRUJU SE VELIKI PROBLEMI U PROIZVODNJI PAPIRIKE A KOJI SE PRVENSTVENO ODOSE NA PRISUSTVO VIRUSNIH OBOLJENJA U USEVIMA. KAO I U PROTEKLE TRI GODINE, TAKO I U OVOJ SEZONI, LABORATORIJSKOM ANALIZOM UZORAKA PAPIRIKE REGISTROVANO JE PRISUSTVO SLEDEĆIH VIRUSA:

- VIRUS MOZAIKA KRASTAVCA (*CUCUMBER MOSAIC VIRUS-CMV*)
 - VIRUS MOZAIKA LUCERKE (*ALFALFA MOSAIC VIRUS-AMV*)
 - VIRUS BRONZAVOSTI PARADAJZA (*TOMATO SPOTTED WILT VIRUS-TSWV*)

OVE GODINE, OD SAMOG NIKANJA I RASAĐIVANJA PAPIRIKE PA SVE DO SADA, REGISTROVANO JE PRISUSTVO VEKTORA NAVEDENIH VIRUSA, VAŠI I TRIPSA. BILJKE SU VEOMA RANO ZARAŽENE I ZAOSTALE SU U PORASTU. NA LISTOVIMA SE REGISTRUJE ŠARENILO, CIGOVANJE NERAVA, IZDUŽENOST LISKI I RAZLIČITI TIPOVI HLOROTIČNIH I NEKROTIČNIH ŠARA. NA NEKIM BILJKAMA DOŠLO JE DO POTPUNE STERILNOSTI, DOK SE NA NEKIM BILJKAMA OBRAZOVAO MANJI BROJ PLODOVA KOJI SU DEFORMISANI. DOMINANTNA SORTA KONZUMNE PAPIRIKE NA TERITORIJI VOJVODINE JE SLONOVO UVO, KOJA JE IZUZETNO OSETLJIVA NA VIROZE I U GOTOVO SVAKOM USEVU SE UOČAVAJU SIMPTOMI VIRUSNIH OBOLJENJA.



SLIKA 1. SIMPTOMI VIROZA NA PAPIRICI



SLIKA 2. SIMPTOMI VIROZA NA PAPRICI



SLIKA 3. SIMPTOMI VIROZA NA PAPRICI

BILJKE ZARAŽENE VIRUSIMA PODLOŽNIJE SU NAPADU DRUGIH PATOGENA, PRE SVEGA U NAŠIM USLOVIMA, PROUZROKOVAČEM BAKTERIOZNE PEGAVOSTI LISTA (*Xanthomonas axonopodis* pv. *vesicatoria*). U PROTEKLIM PERIODU USLOVI SU BILI IZUZETNO POVOLJNI ZA RAZVOJ BAKTERIOZA I NA POJEDINIM BILJKAMA SE REGISTRUJU VEOMA TEŠKE PATOLOŠKE PROMENE A KOD NEKIH BILJAKA JE DOŠLO I DO OPADANJA LISTOVA I PLODOVA. U TAKVIM SLUČAJEVIMA NEKI PROIZVOĐAČI PRIMENJUJU NEDOZVOLJENA SREDSTVA POPUT ANTIBIOTIKA.



SLIKA 4. SIMPTOM BAKTERIOZNE PEGAVOSTI LISTA PAPRIKE

PREPORUKA

APELUJEMO NA PROIZVOĐAČE DA NIKAKO NE UPOTREBLJAVAJU ANTIBIOTIKE I DA JE NJIHOVA PRIMENA STOGO ZABRANJENA! ZA ZAŠTITU PAPRIKE OD BAKTERIOZA PREPORUČUJE SE UPOTREBA BAKARNIH PREPARATA, A TRETMAN JE POTREBNO SPROVESTI PRED NAJAVLJENE PADAVINE ILI NAVODNJAVANJE KIŠENJEM.

PAMUKOVA SOVICA (*Helicoverpa armigera*)

U USEVIMA PAPRIKE REGISTRUJE SE PRISUSTVO JAJA I TEK ISPILJENIH LARVI PAMUKOVE SOVICE. U POSLEDNJIH DESET DANA REGISTRUJU SE I VISOKE BROJNOSTI ODRASLIH JEDINKI

NA FEROMONSKIM KLOPKAMA. PREPORUČUJE SE PROIZVOĐAČIMA PREGLED USEVA NA PRISUSTVO OVE ŠTETOČINE.



SLIKA 5. JAJE PAMUKOVE SOVICE NA LICU LISTA PAPRIKE

PREPORUKA

UKOLIKO SE REGISTRUJE NJENO PRISUSTVO, U CILJU SPREČAVANJA UBUŠIVANJA LARVI U PLODOVE, PREPORUČUJE SE PRIMENA NEKOG OD REGISTROVANIH PREPARATA:

PREPARAT	AKTIVNA MATERIJA	DOZA/KONCENTRACIJA
AVAUNT 15 EC	INDOKSAKARB	0,17-0,25 L/HA
LANNATE 20 SL	METOMIL	1,25 L/HA