

POŠTOVANI POLJOPRIVREDNI PROIZVOĐAČI I DRAGI GLEDAOCI DOBRO DOŠLI U „ZELENU PROGNOZU“
DANAS VAS INFORMIŠEMO O AKTUELNOJ ZAŠTITI JABUKE OD PROUZROKOVAČA BOLESTI

.....

NA PODRUČJU VOJVODINE ZASADI JABUKA SE, U ZAVISNOSTI OD LOKALITETA I SORTIMENTA, NALAZE U RAZLIČITIM FAZAMA CVETANJA, OD POČETKA DO PUNOG CVETANJA.

ZA PODRUČJE VOJVODINE SE OD SREDE NAJAVLJUJU PADAVNE KOJE MOGU STVORITI POVOLJNE USLOVE ZA INFEKCIJE NAJZNAČAJNIJIM PATOGENOM U PROIZVODNJI JABUKE, PROUZROKOVAČEM ČAĐAVE PEGAVOSTI LIŠĆA I KRSTAVOSTI PLODOVA JABUKE. INFEKSIONI POTENCIJAL OVOG PATOGENA U VIDU ASKOSPORA U PREZIMLJUJUĆIM ORGANIMA NA OPALOM LIŠĆU JABUKE JE PRISUTAN U ZASADIMA. LABORATORIJSKIM PREGLEDOM PSEUDOTECIJA KOJI SE VRŠI NA NEDELJNOM NIVOU U PROGNOZNO-IZVEŠTAJNOJ SLUŽBI ZAŠTITE BILJA VOJVODINE, UTVRĐENA JE DOZRELOST DO 50% I SA SVAKIM NAREDNIM PADAVINAMA SE OČEKUJE OSLOBAĐANJE ASKOSPORA I MOGUĆE OSTVARENJE PRIMARNIH INFEKCIJA. UKOLIKO DOĐE DO ZARAZE CVETA U RANIM FAZAMA NJIHOVOG RAZVOJA ONI SE SUŠE I OPADAJU. NAPADNUTI LISTOVI PREVREMENO OPADAJU ŠTO SE ODRAŽAVA NA PRINOS, DOK SE NA PLODOVIMA POJAVLJUJU SIMPTOMI U VIDU KRSTAVOSTI I ONI GUBE TRŽIŠNU VREDNOST.

PREPORUKA

SA CILJEM ZAŠTITE JABUKE OD PROUZROKOVAČA ČAĐAVE PEGAVOSTI LIŠĆA I KRSTAVOSTI PLODOVA JABUKE, PRE NAJAVLJENIH PADAVINA, PREPORUČUJE SE PRIMENA FUNGICIDA:

PREPARAT	AKTIVNA MATERIJA	DOZA/KONCENTRACIJA
MANKOGAL 80, DITHANE M 45, MANKOGAL EKSTRA, PREVENT 80 WP, MANFIL 80 WP, NOTA 75 WG, MANKOSAV 75 WG, PENNCOZEB WG, TITULAR 75 WDG, CANDEZA	MANKOZEB	0,25%

U PERIODU CVETANJA JABUČASTOG VOĆA MOŽE DOĆI DO INFEKCIJE CVETA PROUZROKOVAČEM BAKTERIOZNE PLAMENJAČE JABUČASTOG VOĆA. TO JE NAJDESTUKTIVNIJI PATOGEN JABUKE. SIMPTOMI SE MOGU VIDETI NA MLADARIMA KOJI SU POVIJENI I IMAJU IZGLAD PASTIRSKOG ŠTAPA. ZARAŽENO LIŠĆE SE SUŠI, A U POVOLJNIM USLOVIMA MOŽE DOĆI DO POJAVE BAKTERIJSKOG EKSUDATA U VIDU KAPLJICA ŽUTO-NARANDŽASTE BOJE. U VLAŽNIM USLOVIMA, OVA BAKTERIJA SE VEOMA BRZO ŠIRI I ZA SAMO NEKOLIKO DANA MOŽE SE PROŠIRITI ZA 15 DO 30 CM. KOD MLADIH VOĆAKA MOŽE U JEDNOJ VEGETACIJI IZAZVATI POTPUNO SUŠENJE STABALA.

PREPORUKA

SA PADAVINAMA KOJE SE NAJAVLJUJU OD SREDE, POSTOJI RIZIK OD INFEKCIJE CVETOVA JABUKE OVIM PATOGENOM, TE SE PRED NAJAVLJENE PADAVINE PREPORUČUJE PRIMENA NEKOG OD REGISTROVANIH PREPARATA:

PREPARAT	AKTIVNA MATERIJA	KONCENTRACIJA
FUNGURAN-OH	BAKAR-HIDROKSID	0,05-0,06%
ERWIX	BACILLUS SUBTILIS	10 L/HA
ALIETTE FLASH, FORTUNA	FOSETIL-ALUMINIJUM	0,4 - 0,45%
FOSCO	FOSETIL-ALUMINIJUM	0,3%
LEGAT SP	FOSETIL-ALUMINIJUM	4-4,5 KG/HA

U POJEDINIM ZASADIMA JABUKE SE REGISTRUJE PRISUSTVO SIMPTOMA PEPELNICE JABUKE U VIDU BELIH MLADARA. U ZASADIMA SA OSETLJIVIM SORTIMENTOM POPUT AJADREDA, JONAGOLDA, RED JONAPRINCA I DR, PEPELNICA MOŽE PRIČINITI VELIKE ŠTETE.

U ZASADIMA SA OSETLJIVIM SORTIMENTOM I GDE SU PRISUTNI SIMPTOMI PEPELNICE, PREPORUKA JE PRIMENA NEKOG OD SLEDEĆIH FUNGICIDA:

PREPARAT	AKTIVNA MATERIJA	DOZA
STROBY DF, LUNAR, ASENSA	KRESOKSIM-METIL	0,02%
KARATHANE GOLD 350 EC	MEPTILDINOKAP	0,4-0,5 L/HA

PRILIKOM PRIMENE PESTICIDA OBAVEZNO SE TREBA PRIDRŽAVATI UPUTSTVA ZA UPOTREBU I PREDUZETI SVE MERE U CILJU ZAŠTITE OPRAŠIVAČA.

PRIMENA INSEKTICIDA U FAZI CVETANJA JE ZAKONOM ZABRANJENA!



SLIKA 1. FAZA RAZVOJA JABUKE



SLIKA 2. SIMPTOM ČAĐAVE PEGAVOSTI NA LISTU JABUKE



SLIKA 3. SIMPTOM ČAĐAVE KRSTAVOSTI NA PLODU



SLIKA 4. SIMPTOM BAKTERIOZNE PLAMENJAČE NA GRANI JABUKE, „PASTIRSKI ŠTAP“



SLIKA 5. SIMPTOM BAKTERIOZNE PLAMENJAČE NA PLODU JABUKE



SLIKA 6. SIMPTOM PEPELNICE JABUKE

.....
POŠTOVANI POLJOPRIVREDNI PROIZVOĐAČI I POŠTOVANI GLEDAOCI, DETALJNIJE
INFORMACIJE O POJAVI ŠTETNIH ORGANIZAMA I MERAMA KONTROLE MOŽETE POGLEDATI
NA SAJTU PROGNOZNO IZVEŠTAJNE SLUŽBE ZAŠTITE BILJA VOJVODINE
WWW.PISVOJVODINA.COM