

POŠTOVANI POLJOPRIVREDNI PROIZVOĐAČI I DRAGI GLEDAOCI DOBRO DOŠLI U „ZELENU PROGNOZU“

DANAS VAS INFORMIŠEMO O AZIJSKOJ VOĆNOJ MUŠICI, NJENOM PRISUSTVU U ZASADIMA VOĆA I POTREBI SPROVOĐENJA MERA KONTROLE

.....

AZIJSKA VOĆNA MUŠICA JE ŠTETOČINA JAGODIČASTOG VOĆA, KOŠTIČAVOG VOĆA I VINOVE LOZE. BILNE VRSTE KOJE NAPADA OVA ŠTETOČINA NAJOSETLJIVIJE SU U FAZAMA ZRENJA. ŽENKE POLAŽU JAJA U ZDRAVE PLODOVE. LARVE SE HRANE I RAZVIJAJU UNUTAR PLODOVA I DOLAZI DO NJIHOVOG POTPUNOG UNIŠTENJA. NA POKOŽICI PLODA, GDE ŽENKA POLAŽE JAJA, DOLAZI DO POVREDA I TAKVI PLODOVI SU PODLOŽNI INFEKCIJAMA RAZLIČITIM PROUZROKOVAČIMA TRULEŽI. ŠTETE KOJE PROUZROKUJE OVA ŠTETOČINA MOGU BITI I DO 100%.



SLIKA 1. ODRASLE JEDINKE *D.suzukii* I ŠTETE NA PLODU MALINE



SLIKA 2. OŠTEĆENJA OD *D.suzukii* NA KUPINI

TOKOM PROTEKLE NEDELJE, NA LOVNIM KLOPKAMA ZA MONITORING AZIJSKE VOĆNE MUŠICE DOŠLO JE DO NAGLOG POVEĆANJA ULOVA ODRASLIH JEDINKI U ODNOSU NA PERIOD PRE TOGA KADA SU SE REGISTROVALE SAMO POJEDINAČNE BROJNOSTI.


TRENUTNO SE U ZASADIMA TREŠANJA I REMOTANTNIH SORTI MALINA REGISTRUJE I PREKO 100 JEDINKI AZIJSKE VOĆNE MUŠICE NA NEDELJNOM NIVOU. TRENUTNI VREMENSKI USLOVI SA PADOM TEMPERATURA VAZDUHA I POVIŠENIM VREDNOSTIMA RELATIVNE VLAŽNOSTI VAZDUHA FAVORIZUJU BRZ RAZVOJ I RAZMNOŽAVANJE AZIJSKE VOĆNE MUŠICE, TE SE OČEKUJE POVEĆANJE NJENE BROJNOSTI A SAMIM TIM SE POVEĆAVA I RIZIK OD NASTANKA ŠTETA U ZASADIMA MALINA, KUPINA, BOROVNICA I KASNIH SORTI BRESAKA I NEKTARINA.



SLIKA 3. KLOPKA ZA *D.suzukii*

PREPORUKA


SA CILJEM SMANJENJA RIZIKA NASTANKA ŠTETA OD AZIJSKE VOĆNE MUŠICE U ZASADIMA MALINA, KUPINA, BOROVNICA, I KASNIH SORTI BRESAKA I NEKTARINA, PREPORUČUJE SE PRIMENA SVIH RASPOLOŽIVIH MERA KONTROLE KOJE PODRAZUMEVAJU POSTAVLJANJE VELIKOG BROJA LOVNIH KLOPKI SA CILJEM NJENOG IZLOVLJAVANJA I SMANJENJA BROJNOSTI. MOGU SE KORISTITI KLOPKE NAPRAVLJENE OD PLASTIČNIH FLAŠA SA CRNIM VINOM, JABUKOVIM SIRČETOM U ODNOSU 1:1 I NEKOLIKO KAPI DETERDŽENTA. U CILJU MASOVNOG IZLOVLJAVANJA NEOPHODNO JE POSTAVITI VELIKI BROJ KLOPKI, NA IVIČNE DELOVE PARCELE NA RASTOJANJU OD 2 DO 3 METRA, A UNUTAR PARCELE NA RASTOJANJU OD 5 METARA.



SLIKA 4. KLOPKA ZA *D.suzukii*



SLIKA 5. KLOPKA ZA *D.suzukii*



SLIKA 6. ŠEMA ZA POSTAVLJANJE KLOPKI

TAKOĐE, PREPORUČUJE SE I UNIŠTAVANJE PREZRELIH PLODOVA, SKRAĆIVANJE INTERVALA BERBE, UKLANJANJE DIVLJE KUPINE I DRUGIH DIVLJIH VRSTA VOĆA KOJE MOGU BITI DOMAĆINI OVOJ ŠTETOČINI, KAO I KRČENJE NAPUŠTENIH VOĆNIH ZASADA.

S OBZIROM DA JE U TOKU BERBA MALINE I BOROVNICE I DA SE USKORO OČEKUJE BERBA KUPINE PRIMENA HEMIJSKIH MERA ZAŠTITE U OVIM ZASADIMA SE NE PREPORUČUJE. U ZASADIMA BRESAKA I NEKTARINA SA KASNIM SORTIMENTOM, GDE SE BERBA NE OČEKUJE U NAREDNOM PERIODU, AKTUELNA JE ZAŠTITA OD BRESKVINOG SMOTAVCA TE ĆE SE PRIMENOM INSEKTICIDA SA CILJEM ZAŠTITE OD TE ŠTETOČINE SMANJITI I POPULACIJA AZIJSKE VOĆNE MUŠICE.

.....
 POŠTOVANI POLJOPRIVREDNI PROIZVOĐAČI I DRAGI GLEDAOCI, DETALJNIJE INFORMACIJE O POJAVI ŠTETNIH ORGANIZAMA I MERAMA KONTROLE MOŽETE POGLEDATI NA SAJTU PROGNOZNO IZVEŠTAJNE SLUŽBE ZAŠTITE BILJA VOJVODINE WWW.PISVOJVODINA.COM