

Zelena prognoza za 21.3.2019. - O POTREBI SPROVOĐENJA MERA ZAŠTITE U ZASADIMA JABUKA

FENOFAZE JABUKA

NA PODRUČJU VOJVODINE JABUKE SE, U ZAVISNOSTI OD LOKALITETA I SORTIMENTA, NALAZE U FAZI OD PUCANJA LISNIH PUPOLJAKA DO RAZVOJA PRVIH LISTOVA.



SLIKA 1. FAZA RAZVOJA JABUKE

ČAĐAVA PEGAVOST LISTA I KRSTAVOST PLODOVA JABUKE (*Venturia inaequalis*)

PREGLEDOM PSEUDOTECIJA GLJIVE PROUZROKOVAČA ČAĐAVE PEGAVOSTI LISTA I KRSTAVOSTI PLODOVA JABUKE (*Venturia inaequalis*) IZ PREZIMELOG LIŠĆA, NA TERITORIJI CELE ZEMLJE, UTVRĐENA JE DOZRELOST DO 7,35%. S OBZIROM DA SU PROCENTI DOZRELOSTI PSEUDOTECIJA NISKI, A NISU PROGNOZIRANE PADAVINE U NAREDNIH PET DANA, JOŠ UVEK SE NE OČEKUJE OSLOBAĐANJE ASKOSPORA U PRIRODNIM USLOVIMA. OVO NIJE UOBIČAJENA SITUACIJA NA NAŠEM PODRUČJU, OBIČNO SA KRETANJEM VEGETACIJE JABUKA ZAPOČINJE I ZAŠTITA OD PROUZROKOVAČA ČAĐAVE PEGAVOSTI, ALI ZA SADA SE HEMIJSKE MERE ZAŠTITE U CILJU SUZBIJANJA OVOG PATOGENA NE PREPORUČUJU.

PEPELNICA JABUKE (*Podosphaera leucotricha*)

PEPELNICA JABUKE SE REDOVNO JAVLJA U NAŠIM USLOVIMA NAROČITO KOD OSETLJIVIH SORTI KAO ŠTO SU AJDARED, JONAGOLD, JONATAN I DR. ŠTETE OD PEPELNICE MOGU BITI VEOMA VELIKE, DOLAZI DO NEKROZE I SUŠENJA LIŠĆA I CVASTI, SUŠENJA LASTARA, ŠTO SVE DOVODI DO SMANJENJA RODNOSTI U NAREDNOJ GODINI. PLODOVI MOGU BITI DIREKTNO OŠTEĆENI, A PRE SVEGA JE UMANJEN NJIHOV KVALITET. OVAJ PATOGEN PREZIMLJAVA U OBLIKU MICELIJE U PUPOLJCIMA. KONIDIJE SE FORMIRAJU NA LASTARIMA FORMIRANIM IZ PRIMARNO ZARAŽENIH PUPOLJAKA.



SLIKA 2. SIMPTOMI PEPELNICE JABUKE



SLIKA 3. SIMPTOMI PEPELNICE JABUKE

PREPORUKA

U CILJU SPREČAVANJA RANIH ZARAŽENJA PEPELNICOM JABUKE PREPORUČUJE SE PRIMENA SLEDEĆEG PREPARATA:

PREPARAT	AKTIVNA MATERIJA	DOZA
KARATHANE GOLD 350 EC	MEPTILDINOKAP	0,4-0,5 L/HA