

BILJKA DOMAĆIN: KAJSIJA, BRESKVA, NEKTARINA

TEMA: ZAŠTITA KOŠTIČAVOG VOĆA OD PROUZROKOVAČA MONILIOZE

ZASADI KAJSIJA, BRESAKA I NEKTARINA SE NALAZE U RAZLIČITIM FAZAMA CVETANJA.

U PERIODU CVETANJA KOŠTIČAVOG VOĆA MOŽE DOĆI DO INFEKCIJE CVETA GLJIVOM KOJA PROUZROKUJE SUŠENJE CVETOVA I GRANČICA. OVO OBOLJENJE POZNATO JE U NARODU JOŠ POD NAZIVOM MONILIOZA KOŠTIČAVOG VOĆA.

INFEKCIJA SE OSTVARUJE PREKO ŽIGA TUČKA U PRISUSTVU PADAVINA ILI VISOKE RELATIVNE VLAŽNOSTI VAZDUHA (OKO 85 %) I NA TEMPERATURAMA OD 5°C DO 25°C.

SIMPTOMI ZARAZE SU SUŠENJE CVETOVA KOJI OSTAJU PRILEPLJENI UZ GRANČICE I TAKO PATOGEN PRODIRE U MLADARE STVARAJUĆI NA NJIMA OVALNE PEGE MRKE BOJE. DALJIM RAZVOJEM, MLADARI BIVAJU PRSTENASTO OBUHVAĆENI, TAKO DA SE DEO IZNAD MESTA ZARAZE SUŠI I IZUMIRE. SUŠENJE MLADARA KAJSIJE, BRESKVE I VIŠNJE JE VRLO ČESTA POJAVA U NAŠIM USLOVIMA POGOTOVO U GODINAMA KADA CVETANJE PRATE PADAVINE. PORED ŠTETA NA CVETOVIMA I GRANAMA, OVAJ PATOGEN PROUZROKUJE I TRULEŽ PLODOVA.

PREPORUKA: KAKO SU ZA VIKEND NAJAVLJENE PADAVINE, U SVIM ZASADIMA GDE JE U TOKU CVETANJE, POSTOJI RIZIK OD ZARAZA CVETA PROUZROKOVAČEM MONILIOZE.

UKOLIKO JE VEĆ OSTVARENA INFEKCIJA NIJE MOGUĆE SPREČITI DALJI RAZVOJ BOLESTI, TE JE NEOPHODNO SPOROVESTI PREVENTIVNE MERE ZAŠTITE. U ZASADIMA KAJSIJA SE PREPORUČUJE PRIMENA NEKOG OD REGISTROVANIH FUNGICIDA:

PREPARAT	AKTIVNA MATERIJA	DOZA / KONCENTRACIJA
ATLAS	CIPRODINIL+FLUDIOKSONIL	0,8-1 KG/HA
SIGNUM	BOSKALID+PIRAKLOSTROBIN	0,562-0,75 KG/HA
SCORE 250 EC, SEKVENCA	DIFENOKONAZOL	0,03%

U ZASADIMA BRESAKA I NEKTARINA, PREPORUČUJE SE PRIMENA NEKOG OD REGISTROVANIH FUNGICIDA:

PREPARAT	AKTIVNA MATERIJA	DOZA / KONCENTRACIJA
CIPRODEX	CIPRODINIL	0,05%
NEON	CIPRODINIL	0,5 L/HA
CHORUS 50 WG	CIPRODINIL	0,5 KG/HA
PEHAR	PIRIMETANIL	2 L/HA
DIVERTO	CIPRODINIL	0,5 L/HA
DUOFEN	TIOFANAT-METIL	1,5 L/HA
FUNOMIL	TIOFANAT-METIL	0,07%
SIGNUM	BOSKALID+PIRAKLOSTROBIN	0,562-0,75 KG/HA
AKORD, LIRA	TEBUKONAZOL	0,75 L/HA
EMBRELIA 140 SC	IZOPIRAZAM+DIFENOKONAZOL	0,1%

ZBOG PRISUSTVA PČELA I DRUGIH POLINATORA NA CVETOVIMA, PREPORUČUJU SE TRETMANI U VEČERNJIM SATIMA.

U PERIODU CVETANJA VOĆA ZABRANJENA JE PRIMENA INSEKTICIDA!

DETALJNIJE INFORMACIJE O ŠETNIM ORGANIZMIMA I MERAMA NJIHOVE KONTROLE MOŽETE POGLEDATI NA PORTALU PROGNOZNO-IZVEŠTAJNE SLUŽBE ZA ZAŠTITU BILJA AP VOJVODINE.



SLIKA 1. CVETANJE BRESAKA



SLIKA 2. CVETANJE KAJSIJE



SLIKA 3. SIMPTOM SUŠENJA CVETA I MLADARA NA NEKTARINI



SLIKA 4. SIMPTOM SUŠENJA CVETA I GRANČICE NA KAJSIJI



SLIKA 5. PČELA NA CVETU NEKTARINE