

POŠTOVANI POLJOPRIVREDNI PROIZVOĐAČI I DRAGI GLEDAOCI DOBRO DOŠLI U „ZELENU PROGNOZU“

DANAS VAS INFORMIŠEMO O ZAŠTITI USEVA PŠENICE OD PROUZROKOVAČA BOLESTI LISTA I STABLA

.....

NA PODRUČJU VOJVODINE, NAJVEĆI BROJ PARCELA POD PŠENICOM SE NALAZI U FAZI VLATANJA, OD POČETKA RASTA STABLA DO FORMIRANO DRUGO KOLENCE.

PREGLEDOM USEVA PŠENICE NA PODRUČJU VOJVODINE, UOČENO JE PRISUSTVO SIMPTOMA BILJNIH BOLESTI I TO:

- SIVE PEGAVOSTI LISTA PŠENICE (*Septoria tritici*),
- ŽUTO MRKE PEGAVOSTI LISTA (*Pyrenophora-tritici repentis*) I
- PEPELNICE ŽITA (*Erysiphe graminis*).

INTENZITET PRISUSTVA SIMPTOMA NAVEDENIH OBOLJENJA ZAVISI OD LOKALITETA, SORTIMENTA, FAZE RAZVOJA PŠENICE, GUSTINE USEVA I DO SADA PRIMENJENIH AGROTEHNIČKIH MERA. SVA NAVEDENA OBOLJENJA PROUZROKUJU SUŠENJE LISNE MASE USLED ČEGA SE I PRINOSI SMANJUJU.

SADA NALAZI VEOMA VAŽAN PERIOD U RAZVOJU OVE STRATEŠKI VRLO ZNAČAJNE KULTURE ZA NAŠU ZEMLJU KADA TREBA SAČUVATI LISNU MASU PŠENICE. ZDRAV LIST OMOGUĆAVA NEOMETANO ODVIJANJE SVIH FIZIOLOŠKIH PROCESA U BILJCI I NORMALAN RAZVOJ, ČIME SE OBEZBEĐUJU STABILNI I VISOKI PRINOSI.

PREPORUKA

PROIZVOĐAČIMA PŠENICE SE PREPORUČUJE PREGLED BILJAKA NA PRISUSTVO SIMPTOMA BOLESTI LISTA I STABLA. UKOLIKO SE PREGLEDOM UTVRDI PREKO 10% BILJAKA SA SIMPTOMIMA PEGAVOSTI I PEPELNICE U FAZI DRUGOG KOLENCA, PREDLAŽE SE ZAŠTITA USEVA PŠENICE REGISTROVANIM FUNGICIDIMA KAKO BI SE ZAUSTAVIO DALJI RAZVOJ PATOGENA I ŠIRENJE SIMPTOMA NA GORNJE LISTOVE.

U USEVIMA PŠENICE, ZA SUZBIJANJE PROUZROKOVAČA BOLESTI LISTA I STABLA SU REGISTROVANI SLEDEĆI FUNGICIDI:

PREPARAT	AKTIVNA MATERIJA	DOZA
DUETT ULTRA	EPOSIKONAZOL + TIOFANAT METIL	0,4 – 0,6 L/HA
AMISTAR EXTRA	AZOKSISTROBIN + CIPROKONAZOL	0,5 – 0,75 L/HA
TEATAR PLUS	AZOKSISTROBIN + DIFENOKONAZOL	0,6 – 1 L/HA
ANTRE PLUS	TEBUKONAZOL + TIOFANAT METIL	1,5 L/HA
ZANTARA	TEBUKONAZOL+BIKSAFEN	1-1,25 L/HA
CUSTODIA	TEBUKONAZOL+AZOKSISTROBIN	0,8 L/HA
MIRADOR FORTE	TEBUKONAZOL+AZOKSISTROBIN	1,5-2 L/HA
OPERA MAX	PIRAKLOSTROBIN + EPOSIKONAZOL	1,2 – 2 L/HA
FALCON FORTE	SPIROKSAMIN+TEBUKONAZOL+PROTIKONAZOL	0,7 – 1 L/HA

OSIRIS	EPOSIKONAZOL+METKONAZOL	1,5 – 2,5 L/HA
PRIAXOR EC	FLUKSAPIROKSAD+PIRAKLOSTROBIN	0,75 – 1,5 L/HA
ASCRA XPRO	BIKSAFEN+FLUOPIRAM+PROTIKONAZOL	0,9 – 1,2 L/HA
POSTULAT DUO	PROTIKONAZO+TIOFANAT-METIL	1-1,25 L/HA
CEROX	TRIFLOKSISTROBIN+CIPROKONAZOL	0,3-0,5 L/HA
SIGURIS EXTRA	AZOKSISTROBIN+IZOPIRAZAM+CIPROKONAZOL	0,75-1 L/HA

ILI NEKI DRUGI REGISTROVANI FUNGICID.

HEMIJSKE MERE ZAŠTITE TREBA SPROVESTI PO MIRNOM I SUVOM VREMENU NA TEMPERATURAMA VAZDUHA PREKO 15°C ZBOG EFIKASNIJEG DELOVANJA FUNGICIDA.



SLIKA 1. USEV PŠENICE



SLIKA 2. SIMPTOM SIVE PEGAVOSTI LISTA PŠENICE



SLIKA 3. SIMPTOM SIVE PEGAVOSTI LISTA PŠENICE



SLIKA 4. SIMPTOM ŽUTO MRKE PEGAVOSTI LISTA



SLIKA 5. SIMPTOM ŽUTO MRKE PEGAVOSTI LISTA



SLIKA 6. SIMPTOM PEPELNICE NA LISTU PŠENICE



SLIKA 7. SIMPTOM PEPELNICE NA STABLU PŠENICE

POŠTOVANI POLJOPRIVREDNI PROIZVOĐAČI I POŠTOVANI GLEDAOCI, DETALJNIJE INFORMACIJE O POJAVI ŠTETNIH ORGANIZAMA I MERAMA KONTROLE MOŽETE POGLEDATI NA SAJTU PROGNOZNO IZVEŠTAJNE SLUŽBE ZAŠTITE BILJA VOJVODINE WWW.PISVOJVODINA.COM