

POŠTOVANI POLJOPRIVREDNI PROIZVOĐAČI I DRAGI GLEDAOCI DOBRO DOŠLI U „ZELENU PROGNOZU“  
DANAS VAS INFORMIŠEMO O STANJU U ZASADIMA KRUŠAKA

.....

### **FAZE RAZVOJA KRUŠAKA**

NA PODRUČJU VOJVODINE KRUŠKE SE U ZAVISNOSTI OD SORTIMENTA I LOKALITETA NALAZE U FAZI OD PREČNIK PLODA DO 40 MM DO FAZE PLODOVI OKO POLOVINE KRAJNJE VELIČINE. BERBA RANIH SORTI (JUNSKA LEPTICA) JE U TOKU.



SLIKA 1: FAZA RAZVOJA KRUŠKE

### **OBIČNA KRUŠKINA BUVA (*Cacopsylla pyri*)**

OBIČNA KRUŠKINA BUVA JE NAJZNAČAJNIJA ŠTETOČINA KRUŠKE NA NAŠEM PODRUČJU. GLAVNI JE PROBLEM U INTENZIVNOJ PROIZVODNJI KRUŠAKA. ŠTETE NANOSE LARVE KOJE SISAJU SOKOVE BILJAKA, A VIŠAK HRANE IZLUČUJU U VIDU MEDNE ROSE NA KOJU SE NASELJAVA GLJIVA ČAĐAVICA. ČAĐAVI BILJNI DELOVI SMANJUJU ASIMILACIONU POVRŠINU ŠTO SE ODRAŽAVA NA SMANJENJE PRINOSA, A ČAĐAVI PLODOVI IMAJU MANJU TRŽIŠNU VREDNOST.



SLIKA 2. LARVE OBIČNE KRUŠKINE BUVE U MEDNOJ ROSI



SLIKA 3. PLOD KRUŠKE SA LARVAMA U MEDNOJ ROSI

## STANJE U ZASADIMA KRUŠAKA

VIZUELNIM PREGLEDOM KRUŠIKA REGISTRUJE SE DOMINANTNO PRISUSTVO MLAĐIH I STARIJH LARVENIH STUPNJEVA OBIČNE KRUŠKINE BUVE. U TOKU JE INTENZIVNO PILJENJE LARVI DRUGE LETNJE GENERACIJE OVE ŠTETOČINE.



SLIKA 4. MLAĐE I STARIJE LARVE OBIČNE KRUŠKINE BUVE



SLIKA 5. MLAĐE I STARIJE LARVE OBIČNE KRUŠKINE BUVE U PAZUHU LISTA

#### PREPORUKA

SA CILJEM SUZBIJANJA OBIČNE KRUŠKINE BUVE, PROIZVOĐAČIMA SE PREPORUČUJE PRIMENA INSEKTICIDA:

PREPARAT	AKTIVNA MATERIJA	KONCENTRACIJA	MBT
DELEGATE 250 WG	SPINETORAM	0,3-0,4 KG/HA	2

PRILIKOM PRIMENE PESTICIDA, OBAVEZNO TREBA VODITI RAČUNA O MAKSIMALNOM BROJU TRETMANA (MBT) U TOKU JEDNE VEGETACIJE PRIMENJENIH PREPARATA.

PREPORUKA JE DA SE TRETMAN SPROVEDE U VEČERNJIM ČASOVIMA ZBOG VISOKIH DNEVNIH TEMPERATURA VAZDUHA, A UZ INSEKTICID SE PREPORUČUJE I PRIMENA OKVAŠIVAČA KOJI IMA ULOGU RAZLAGANJA MEDNE ROSE I POJAČANJA INSEKTICIDNOG DELOVANJA.

S OBZIROM DA SE PROGNOZIRA DUŽI PERIOD SA VISOKIM DNEVNIM TEMPERATURAMA, U OVOM MOMENTU SE MOŽE PREPORUČITI I PRIMENA NEORGANSKOG ĐUBRIVA FESIL U KONCENTRACIJI 0,15%. OVAJ TRETMAN IMA ZA CILJA DA OGOLI LARVE (RAZLOŽI MEDNU ROSU), NAKON ČEGA ONE POSTAJU VEOMA OSETLJIVE NA VISOKE TEMPERATURE I UGINJAVAJU. PREPORUKA JE DA SE OVAJ TRETMAN SPROVEDE U NAJTOPLIJEM DELU DANA. U OVOM PERIODU NIKAKO NE TREBA DOZVOLITI LUČENJE VELIKE KOLIČINE MEDNE ROSE OD STRANE LARVI OBIČNE KRUŠKINE BUVE, JER SE NA NJU MOŽE NASELITI GLJIVA ČAĐAVICA KOJA U MNOGOME SMANJUJE KVALITET PA SAMIM TIM I VREDNOST PLODOVA.

.....  
POŠTOVANI POLJOPRIVREDNI PROIZVOĐAČI I POŠTOVANI GLEDAOCI, DETALJNIJE INFORMACIJE O POJAVI ŠTETNIH ORGANIZAMA I MERAMA KONTROLE MOŽETE POGLEDATI NA SAJTU PROGNOZNO IZVEŠTAJNE SLUŽBE ZAŠTITE BILJA VOJVODINE [WWW.PISVOJVODINA.COM](http://WWW.PISVOJVODINA.COM)