

POŠTOVANI POLJOPRIVREDNI PROIZVOĐAČI I DRAGI GLEDAOCI DOBRO DOŠLI U „ZELENU PROGNOZU“
DANAS VAS INFORMIŠEMO O ZAŠTITI USEVA ŠEĆERNE REPE OD PROUZROKOVAČA PEGAVOSTI LIŠĆA REPE

.....

NA PODRUČJU VOJVODINE USEVI ŠEĆERNE REPE SE U ZAVISNOSTI OD DATUMA SETVE I NAČINA GAJENJA (SUVO RATARANJE ILI U SISTEMU ZA NAVODNJAVANJE) NALAZE U FAZI OD PRED ZATVARANJE REDOVA DO FAZE RAZVOJA KORENA.

U NAŠIM PROIZVODNIM USLOVIMA PEGAVOST LIŠĆA JE EKONOMSKI NAJZNAČAJNIJA BOLEST ŠEĆERNE REPE. SIMPTOMI SE PRVO JAVLJAJU NA STARIJEM LIŠĆU U VIDU OKRUGLASTIH, SITNIH, SIVKASTIH PEGA OVIČENIH MRKOCRVENOM BOJOM. SA RAZVOJEM BOLESTI BROJ PEGA SE POVEĆAVA I MOŽE DOĆI DO SUŠENJA DELOVA ILI CELOG LISTA. POSLE UGINUĆA VEĆEG BROJA LISTOVA OBIČNO DOLAZI DO RETROVEGETACIJE, ŠTO SE NEGATIVNO ODRAŽAVA NA PRINOS KORENA. OSIM DIREKTNIH GUBITAKA U PRINOSU, ŠTETE NASTAJU I ZBOG POGORŠANJA TEHNOLOŠKE VREDNOSTI ŠEĆERNE REPE.

VIZUELNIM PREGLEDOM PROIZVODNIH PARCELA POD ŠEĆERNOM REPOM REGISTROVANO JE PRISUSTVO POJEDINAČNIH PEGA OD POMENUTOG PATOGENA. U ZAVISNOSTI OD LOKALITETA, OSETLJIVOSTI SORTE I UČESTALOSTI GAJENJA ŠEĆERNE REPE NA ISTIM PARCELAMA, PRISUSTVO PEGA JE REGISTROVANO NA 1% DO 15% BILJAKA.

S OBZIROM NA USLOVE KOJI SU VLADALI U PROIZVODNJI ŠEĆERNE REPE U PRVOJ POLOVINI JUNA, A KOJI SU OMOGUĆILI REALIZACIJU VIŠE PARALELNIH CIKLUSA INFEKCIJE, U NAREDNIH NEKOLIKO DANA SE OČEKUJE NAGLO POVEĆANJE BROJA BILJAKA SA PEGAMA.


SA CILJEM ZAŠTITE ŠEĆERNE REPE OD PROUZROKOVAČA PEGAVOSTI LIŠĆA REPE, PROIZVOĐAČIMA SE PREPORUČUJE PRIMENA HEMIJSKIH MERA ZAŠTITE KOMBINACIJOM PREVENTIVNIH I SISTEMIČNIH FUNGICIDA. PREDLAŽE SE DA SE TRETMANI NAJPRE IZVRŠE KOD OSETLJIVOG SORTIMENTA GDE SE VEĆ SADA REGISTRUJE PREKO 10% BILJAKA SA PEGAMA. U USEVIMA ŠEĆERNE REPE ZA ZAŠTITU OD PROUZROKOVAČA PEGAVOSTI LISTA SU REGISTROVANI SLEDEĆI FUNGICIDI:

PREVENTIVNI FUNGICIDI:

PREPARATI	AKTIVNA MATERIJA	DOZA
MANKOGAL 80	MANKOZEB	2 KG/HA
MANKOGAL 400 SC	MANKOZEB	3,5-4 L/HA
NORDOX 75 WG	BAKAR-OKSID	1,25 KG/HA
BLAUVIT	BAKAR-HIDROKSID	2 KG/HA

SISTEMIČNI FUNGICIDI:

PREPARATI	AKTIVNA MATERIJA	DOZA
AMISTAR EXTRA, ARCON EXTRA, COMRADE, AMICER EXTRA	AZOKSISTROBIN+CIPROKONAZOL	0,6-0,75 L/HA
AMISTAR GOLD, TEATAR PLUS	AZOKSISTROBIN+DIFENOKONAZOL	1 L/HA
PROPULSE 250 SE	FLUOPIRAM+PROTIOKONAZOL	1-1,2 L/HA
UNIFY	PIRAKLOSTROBIN+ PROTIOKONAZOL	0,75-0,9 L/HA
ZAMIR	PROHLORAZ+TEBUKONAZOL	1 L/HA
ANTRE PLUS	TEBUKONAZOL+TIOFANAT-METIL	1,5 L/HA
SEKVENCA PLUS	DIFENOKONAZOL+TIOFANAT-METIL	1,5 L/HA
SPYRALE	DIFENOKONAZOL+FENPROPIDIN	0,75 L/HA
VINTAGE ME	DIFENOKONAZOL+FLUTRIAFOL	0,6-0,8 L/HA
SPHERE, CEROX, VENERE	TRIFLOKSISTROBIN+CIPROKONAZOL	0,25-0,35 L/HA
SANUS	TIOFANAT-METIL+TEBUKONAZOL+CIFLUFENAMID	1,5-2 L/HA



SLIKA 1. USEV ŠEĆERNE REPE



SLIKA 2. SIMPTOM PEGAVOSTI LIŠĆA REPE



SLIKA 3. SIMPTOM PEGAVOSTI LIŠĆA REPE



SLIKA 4. SIMPTOM PEGAVOSTI LIŠĆA REPE I KONIDIJA *Cercospora beticola*



SLIKA 5. SIMPTOM PEGAVOSTI LIŠĆA REPE



SLIKA 6. SIMPTOM PEGAVOSTI LIŠČA REPE



SLIKA 7. SIMPTOM PEGAVOSTI LIŠĆA REPE



SLIKA 8. SIMPTOM PEGAVOSTI LIŠĆA REPE

.....
POŠTOVANI POLJOPRIVREDNI PROIZVOĐAČI I POŠTOVANI GLEDAOCI, DETALJNIJE
INFORMACIJE O POJAVI ŠTETNIH ORGANIZAMA I MERAMA KONTROLE MOŽETE POGLEDATI
NA SAJTU PROGNOZNO IZVEŠTAJNE SLUŽBE ZAŠTITE BILJA VOJVODINE
WWW.PISVOJVODINA.COM