

Zelena prognoza za 23.5.2019. - O STANJU U USEVIMA LUKA

FAZE LUKA

NA PODRUČJU VOJVODINE USEVI OZIMOG LUKA SU U FAZI LUKOVICE NARASLE OD 50 DO 70% OD KRAJNJEG PREČNIKA, DOK SE USEVI PROLEĆNOG LUKA NALAZE U FAZI OD 3 DO 4 LISTOVA RAZVIJENO.



SLIKA 1. USEV OZIMOG LUKA

NA AUTOMATSKIM METEORLOŠKIM STANICAMA POSTAVLJENIM U USEVIMA LUKA, U PROTEKLOM PERIODU KONSTANTNO SE BELEŽE SE VEOMA POVOLJNI USLOVI ZA OSTVARENJE INFEKCIJA PROUZROKOVAČA PLAMENJAČE LUKA (*Peronospora destructor*). NA POJEDINIM PARCELAMA OZIMOG LUKA GDE NISU SPROVEDENE ADEKVATNE MERE ZAŠTITE REGISTRUJU SE SIMPTOMI OVOG PATOGENA.

PLAMENJAČA LUKA (*Peronospora destructor*)

SIMPTOMI PLAMENJAČE SE NA PARCELI JAVLJAJU PO OAZAMA. NA LISTOVIMA SE REGISTRUJU BLEDE OVALNE PEGE RAZLIČITIH VELIČINA. U USLOVIMA POVEĆANE VLAŽNOSTI, U OKVIRU OVIH IZDUŽENIH PEGA FORMIRAJU SE SPORONOSNI ORGANI GLJIVE. PEGE MENJAJU BOJU PREMA LJUBIČASTOJ, A ZARAŽENI LISTOVI VENU I NA KRAJU SASVIM PROPADAJU. IZ LISTA SE ZARAZA DALJE ŠIRI PREMA GLAVICI ŠTO MOŽE DA DOVEDE DO ZARAZE UNUTRAŠNJIH LJUSPASTIH LISTIĆA. OVAKVI LUKOVI NISU POGODNI ZA SKLADIŠTENJE I PODLOŽNI SU NAPADU DRUGIH PATOGENA.



SLIKA 2. SIMPTOM PLAMENJAČE NA LISTU LUKA



SLIKA 3. KONIDIOFORE SA KONIDIJAMA PROUZROKOVAČA PLAMENJAČE LUKA

PREPORUKA

U CILJU SPREČAVANJA DALJEG RAZVOJA I ŠIRENJA PLAMENJAČE, U USEVIMA OZIMOG LUKA, PREPORUČUJE SE PRIMENA FUNGICIDA KOJI IMAJU KONTAKTNO I SISTEMIČNO DELOVANJE:

PREPARAT	AKTIVNA MATERIJA	DOZA
FOLIO GOLD	HLOROTALONIL+METALAKSIL	2-2,5 L/HA
VERITA	FOSETIL-ALUMINIJUM + FENAMIDON	2-2,5 KG/HA

PRILIKOM PRIMENE PESTICIDA OBAVEZNO VODITI RAČUNA O KARENCI KOJA ZA NAVEDENE FUNGICIDE IZNOSI 14 DANA.

U USEVU PROLEĆNOG LUKA PREPORUČUJE SE PRIMENA NEKOG OD PREVENTIVNIH FUNGICIDA:

PREPARAT	AKTIVNA MATERIJA	DOZA
DAKOFLO	HLOROTALONIL	2-2,5 L/HA
BRAVO 720 S		1,5-2 L/HA
ODEON		1,2-1,5 KG/HA