

POŠTOVANI POLJOPRIVREDNI PROIZVOĐAČI I DRAGI GLEDAOCI DOBRO DOŠLI U „ZELENU PROGNOZU“

DANAS VAS INFORMIŠEMO O STANJU U ZASADIMA JABUKA

.....

NA PODRUČJU VOJVODINE, U ZAVISNOSTI OD LOKALITETA I SORTIMENTA, JABUKE SE NALAZE U FAZI OD POČETKA BUBRENJA PUPOLJAKA DO POJAVE ZELENIH LISTIĆA.

U NAŠOJ ZEMLJI, NAJZNAČAJNIJA BOLEST U PROIZVODNJI JABUKA JE ČAĐAVA PEGAVOST LISTA I KRSTAVOST PLODA JABUKE. JAVLJA SE SVAKE GODINE, U SVAKOM ZASADU. UKOLIKO SE NE SPROVODE HEMIJSKE MERE ZAŠTITE PROTIV OVOG OBOLJENJA, ŠTETE MOGU BITI I STOPOSTOTNE. NA LIŠĆU SE JAVLJAJU ČAĐAVE PEGE KOJE PROUZROKUJU PREVREMENO OPADANJE LIŠĆA. PLODOVI MOGU DA SE ZARAZE OD ZAMETANJA DO BERBE I NA NJIMA SE JAVLJAJU CRNE KRSTAVE PEGE USLED ČEGA PLODOVI PUCAJU, DEFORMIŠU SE I GUBE TRŽIŠNU VREDNOST. PORED SMANJENJA PRINOSA I KVALITETA PLODOVA, USLED PREVREMENOG OPADANJA LIŠĆA SMANJUJE SE I RODNOST U NAREDNOJ GODINI.

PATOGEN KOJI PROUZROKUJE OVU BOLEST PREZIMLJAVA U OPALOM LIŠĆU JABUKA IZ PRETHODNE GODINE U OBLIKU CRNIH SITNIH TELAŠACA U KOJIMA SE NALAZE SPORE KOJE VRŠE ZARAZE U NOVOJ VEGETACIJI.

U SISTEMU PROGNOZNO IZVEŠTAJNE SLUŽBE ZAŠTITE BILJA VOJVODINE SE NA NEDELJNOM NIVOU PRATI DOZREVANJE TIH PREZIMLJUJUĆIH ORGANA-PSEUDOTECIJA KAKO BI SE STEKAO UVID U TO KADA JE GLJIVA BIOLOŠKI SPREMNA NA OSTVARENJE NOVIH ZARAZA I KADA POČINJE RIZIK OD NASTANKA INFEKCIJA U NOVOJ VEGETACIJI. U OVONEDELJNOM PREGLEDU, DOZRELOST PSEUDOTECIJA SE KREĆE IZMEĐU 10 I 20%. TO ZNAČI DA **SA PRVIM SLEDEĆIM PADAVINAMA POSTOJI RIZIK OD OSTVARENJA ZARAZA U ZASADIMA JABUKA OD PROUZROKOVAČA ČAĐAVE PEGAVOSTI LISTA I KRSTAVOSTI PLODA.**

S OBZIROM NA NAJAVLJENI PORAST TEMPERATURA KOJI ĆE UBRZATI I KRETANJE VEGETACIJE A I DOZREVANJE PSEUDOTECIJA, PREPORUKA JE DA SE U ZASADIMA JABUKA GDE JE DOŠLO DO PUCANJA PUPOLJAKA I POJAVE ZELENE LISNE MASE, PRED NAJAVLJENE PADAVINE, SPROVEDE TRETMAN NEKIM OD PREPARATA NA BAZI BAKRA:

PREPARAT	AKTIVNA MATERIJA	DOZA/KONCENTRACIJA PRIMENE
FUNGURAN OH	BAKAR-HIDROKSID	2 KG/HA
CUPRABLAU Z ULTRA		2,5 KG/HA
FUNGOHEM SC		1,5 – 3 KG/HA
EVEREST		3 – 4 L/HA

OVAJ TRETMAN PREPARATIMA NA BAZI BAKRA JE IZUZETNO VAŽAN JER SE NJIME SMANJUJE I INFEKTIVNI POTENCIJAL BAKTERIJE KOJA PROUZROKUJE PLAMENJAČU KOD JABUČASTOG VOĆA.

U ZASADIMA GDE JE PROŠLE GODINE ZABELEŽEN JAK NAPAD LISNIH VAŠI, ŠTITASTIH VAŠI ILI GRINJA, PREPORUČUJE SE I PRIMENA PREPARATA NA BAZI MINERALNOG ULJA (GALMIN) U KONCETRACIJI 3%.



SLIKA 1. FAZA RAZVOJA JABUKE




SLIKA 2. SIMPTOM ČĎAVE PEGAVOSTI NA LISTU JABUKE



SLIKA 3. SIMPTOM KRASTAVOSTI NA PLODU JABUKE



SLIKA 4. SIMPTOM KRSTAVOSTI NA PLODU JABUKE



SLIKA 5. PSEUDOTECIJE *Venturia inaequalis* NA PREZIMELOM LIŠĆU JABUKE



SLIKA 6. ZRELE ASKOSPORE U ASKUSU



SLIKA 7. JAJA CRVENOG VOĆNOG PAUKA

.....  
POŠTOVANI POLJOPRIVREDNI PROIZVOĐAČI I POŠTOVANI GLEDAOCI, DETALJNIJE  
INFORMACIJE O POJAVI ŠTETNIH ORGANIZAMA I MERAMA KONTROLE MOŽETE POGLEDATI  
NA SAJTU PROGNOZNO IZVEŠTAJNE SLUŽBE ZAŠTITE BILJA VOJVODINE  
[WWW.PISVOJVODINA.COM](http://WWW.PISVOJVODINA.COM)