

**BILJNA VRSTA:** PARADAJZ

**ŠTETNI ORGANIZMI:** MOLJAC PARADAJZA, BILJNE VAŠI, TRIPSI

USEVI PARADAJZA U ZATVORENOM PROSTORU SE NALAZE U RAZLIČITIM FAZAMA U ZAVISNOSTI OD DATUMA RASAĐIVANJA, OD RAZVOJA LISTOVA DO RAZVOJA PLODOVA.

VIZUELNIM PREGLEDOM BILJAKA REGISTRUJE SE PRISUSTVO SLEDEĆIH ŠTETOČINA:

- MOLJCA PARADAJZA
- BILJNIH VAŠI
- TRIPSA

**MOLJAC PARADAJZA** JE NAJZNAČAJNIJA ŠTETOČINA PARADAJZA U ZATVORENOM PROSTORU. ŠTETE PRIČINJAVAJU LARVE KOJE SE HRANE SREDIŠNJIM DELOM LISTA PRAVEĆI KARAKTERISTIČNE MINE KAO I PLODOVIMA U KOJE SE UBUŠUJU. NAPADNUTI PLODOVI SU UPRLJANI IZMETOM I PODLOŽNI SU ZARAZAMA RAZLIČITIH PROUZROKOVAČA TRULEŽI.

NA FEROMONSKIM KLOPKAMA POSTAVLJENIM U USEVE PARADAJZA REGISTRUJE SE POVEĆANJE BROJNOSTI OVE ŠTETOČINE, A VIZUELNIM PREGLEDOM BILJAKA UOČAVA SE PRISUSTVO JAJA, LARVI I OŠTEĆENJA OD NJIHOVE ISHRANE U VIDU MINA NA LISTOVIMA.

#### PREPORUKA

PROGNOZIRANI PORAST TEMPERATURE UBRZAĆE RAZVOJ MOLJCA PARADAJZA I DOVESTI DO NJEGOVE POVEĆANE AKTIVNOSTI. SADA JE VEOMA VAŽNO SPROVOĐENJE SVIH RASPOLOŽIVIH MERA KONTROLE MOLJCA KAKO BI SE SPREČILO PODIZANJE POPULACIJE INSEKTA I ŠTETE NA BILJKAMA. PREDLAŽE SE:

- POSTAVLJANJE VODENIH KLOPKI SA CILJEM MASOVNOG IZLOVLJAVANJA ODRASLIH JEDINKI
- POSTAVLJANJE MREŽE PROTIV INSEKATA NA ULAZ U OBJEKAT, KAO I NA MESTA ZA PROVETRAVANJA OBJEKTA
- UNIŠTAVANJE KOROVA
- UKLANJANJE I UNIŠTAVANJE LISTOVA SA MINAMA
- HEMIJSKE MERE ZAŠTITE PRIMENOM REGISTROVANOG INSEKTICIDA:

PREPARAT	AKTIVNA MATERIJA	DOZA	KARENCA
EXALT	SPINETORAM	2-2,4 L/HA	3 DANA

VIZUELNIM PREGLEDOM BILJAKA REGISTRUJE SE I PRISUSTVO **BILJNIH VAŠI** I **TRIPSA**. ŠTETE PRIČINJAVAJU SISANJEM BILJNIH SOKOVA, ALI SU MNOGO ZNAČAJNIJE INDIREKTNE ŠTETE KOJE SE OGLEDAJU U PRENOŠENJU BILJNIH VIRUSA OD KOJIH SU ZA PROIZVODNJU PARADAJZA NAJZNAČAJNIJI VIRUS MOZAIKA KRASTAVCA (KOGA PRENOSE VAŠI) I VIRUS BRONZAVOSTI PARADAJZA (KOGA PRENOSE TRIPSI).

#### PREPORUKA

NAVEDENI PREPARAT ZA SUZBIJANJE MOLJCA PARADAJZA DELOVAĆE I NA SUZBIJANJE TRIPSA. UKOLIKO SE REGISTRUJE PRISUSTVO VAŠI PREPORUČUJE SE PRIMENA NEKOG OD REGISTROVANIH INSEKTICIDA:

PREPARAT	AKTIVNA MATERIJA	DOZA	KARENCA
TEPPEKI/AFINTO	FLONIKAMID	0,06-0,1 KG/HA	1 DAN
MOSPILAN 20 SG ZLATOSPILAN VOLLEY 20 SP	ACETAMIPRID	0,25 KG/HA 0,0125- 0,025% 0,2-0,25 KG/HA	14 DANA

DETALJNIJE INFORMACIJE O ŠETNIM ORGANIZMIMA I MERAMA NJIHOVE KONTROLE MOŽETE POGLEDATI NA PORTALU PROGNOZNO-IZVEŠTAJNE SLUŽBE ZA ZAŠTITU BILJA AP VOJVODINE.



SLIKA 1. FAZA RAZVOJA PARADAJZA



SLIKA 2. ODRASLE JEDINKE (KOPULACIJA) MOLJCA PARADAJZA I JAJA NA LICU LISTA



SLIKA 3. LARVE MOLJCA PARADAJZA I ŠTETE NA LISTOVIMA



SLIKA 4. OŠTEĆENJA OD MOLJCA PARADAJZA NA LISTOVIMA I PLODOVIMA



SLIKA 5. TRIPS U CVETU PARADAJZA



SLIKA 6. VAŠI NA PARADAJZU



SLIKA 7. SIMPTOMI VIROZA NA PARADAJZU



SLIKA 8. SIMPTOM VIROZA NA PLODU PARADJZA