

POŠTOVANI POLJOPRIVREDNI PROIZVOĐAČI I DRAGI GLEDAOCI DOBRO DOŠLI U „ZELENU PROGNOZU“
DANAS VAS INFORMIŠEMO O STANJU U ZASADIMA JABUKA

FENOFAZE JABUKA

NA PODRUČJU VOJVODINE U ZAVISNOSTI OD LOKALITETA I SORTIMENTA JABUKE SE NALAZE U RAZLIČITIM FAZAMA RAZVOJA CVETNIH PUPOLJAKA.



SLIKA 1. FAZA RAZVOJA

POČETKOM OVE NEDELJE REGISTROVANE SU VEOMA NISKE TEMPERATURE VAZDUHA KOJE SU DOVELE DO IZMRZAVANJA CVETNIH PUPOLJAKA U POJEDINIM ZASADIMA JABUKA. NA AUTOMATSKIM METEOROLOŠKIM STANICAMA KOJE SU U OKVIRU RADA SISTEMA PROGNOZNO-IZVEŠTAJNE SLUŽBE ZAŠTITE BILJA AP VOJVODINE POSTAVLJENE U JABUČNJACIMA, NAJNIŽE TEMPERATURE SU REGISTROVANE U PONEDELJAK U RANIM JUTARNJIM ČASOVIMA I NA POJEDINIM LOKALITETIMA SU SE KRETALE DO MINUS 6°C.



SLIKA 2. ŠTETE OD MRAZA



SLIKA 3. ŠTETE OD MRAZA

IAKO SU U POJEDINIM ZASADIMA REGISTROVANE ŠTETE OD IZMRZAVANJA, U OVOM TRENUTKU JE VEOMA VAŽNO ZAŠTITITI LISNU MASU OD NAJZNAČNIJEG PATOGENA U PROIZVODNJI JABUKA U NAŠIM USLOVIMA, OD PROUZROKOVAČA ČAĐAVE PEGAVOSTI LISTA I KRSTAVOSTI PLODOVA JABUKE (*Venturia inaequalis*).

NALAZIMO SE NA POČETKU PERIODA PRIMARNIH INFEKCIJA OD OVOG PATOGENA.

U OVONEDELJNOJ LABORATORIJSKOJ ANALIZI PREZIMELOG LIŠĆA JABUKE KONSTATOVANI SU VISOKI PROCENTI DOZRELOSTI PSEUDOTECIJA OVE GLJIVE KOJI SE KREĆU I DO 40%. OVAKVI PROCENTI DOZRELOSTI PSEUDOTECIJA UKAZUJU NA SPOSOBNOST GLJIVE DA U USLOVIMA VLAŽNOSTI OSLOBAĐA VELIKI BROJ ASKOSPORA.



SLIKA 4. SIMPTOM ČAĐAVE PEGAVOSTI NA LISTU JABUKE



SLIKA 5. ZRELE ASKOSPORE GLJIVE

PREPORUKA

SA NAJAVLJENIM PADAVINAMA PROGNOZIRA SE INTENZIVNO OSLOBAĐANJE ASKOSPORA I VISOK RIZIK OD INFEKCIJA OD PROUZROKOVAČA ČAĐAVE PEGAVOSTI LISTA I KRSTAVOSTI PLODOVA JABUKE.

PRED NAJAVLJENE PADAVINE PREPORUČUJE SE PRIMENA KOMBINACIJE PREVENTIVNOG I SISTEMIČNOG FUNGICIDA:

PREPARAT	AKTIVNA MATERIJA	KONCENTRACIJA PRIMENE
MANKOGAL-80 ILI DITHANE M-45 +	MANKOZEB +	0,25% +
PEHAR ILI PYRUS 400 SC	PIRIMETANIL	0,1%

TAKOĐE, U ZASADIMA JABUKA SE PREPORUČUJE I ZAŠTITA OD PROUZROKOVAČA PEPELNICE (*Podosphaera leucotricha*).

U ZASADIMA SA OSETLJIVIM SORTAMA POPUT JONAGOLD, JONATAN, AJDARED I GDE SU REGISTROVANI SIMPTOMI PEPELNICE, PREPORUČUJE SE PRIMENA FUNGICIDA:

PREPARAT	AKTIVNA MATERIJA	DOZA/KONCENTRACIJA
KARATHANE GOLD 350-EC	MEPTILDINOKAP	0,4-0,5 L/HA



SLIKA 6. SIMPTOM PEPELNICE JABUKE

.....
POŠTOVANI POLJOPRIVREDNI PROIZVOĐAČI I POŠTOVANI GLEDAOCI, DETALJNIJE INFORMACIJE O POJAVI ŠTETNIH ORGANIZAMA I MERAMA KONTROLE MOŽETE POGLEDATI NA SAJTU PROGNOZNO IZVEŠTAJNE SLUŽBE ZAŠTITE BILJA VOJVODINE WWW.PISVOJVODINA.COM