

POŠTOVANI POLJOPRIVREDNI PROIZVOĐAČI I DRAGI GLEDAOCI DOBRO DOŠLI U „ZELENU PROGNOZU“
DANAS VAS INFORMIŠEMO O AKTUELNOJ ZAŠTITI ZASADA KOŠTIČAVOG VOĆA KOJE SE NALAZI U FAZI CVETANJA

.....

FENOFAZE RAZVOJA KOŠTIČAVOG VOĆA

NA PODRUČJU VOJVODINE, PROIZVODNI ZASADI KAJSIJA, BRESAKA I NEKTARINA SE NALAZE U RAZLIČITIM FAZAMA CVETANJA, A U NAREDNIM DANIMA SE OČEKUJE POČETAK CVETANJA I KOD OSTALOG RANOSTASNOG KOŠTIČAVOG VOĆA.

ZA PODRUČJE VOJVODINE SE OD ČETVRTKA NAJAVLJUJE VIŠEDNEVNI KIŠNI PERIOD. U PERIODU CVETANJA KOŠTIČAVOG VOĆA I U USLOVIMA VLAŽNOSTI, POSTOJI RIZIK OD INFEKCIJE CVETA PROUZROKOVAČEM SUŠENJA CVETOVA, GRANA I GRANČICA KOŠTIČAVOG VOĆA (*Monilia laxa*). OVA GLJIVA JE POZNATA JOŠ POD NAZIVOM MONILIOZA KOŠTIČAVOG VOĆA, A PORED ŠTETA NA CVETOVIMA I GRANAMA PROUZROKUJE I TRULEŽ PLODOVA.

PATOGEN PREZIMLJAVA U RAK RANAMA I U MUMIFICIRANIM PLODOVIMA KOJI PREKO ZIME OSTAJU NA GRANAMA ILI SE NALAZE NA POVRŠINI ZEMLJIŠTA. KAKO SE MUMIFICIRANI PLODOVI VRLO ČESTO SREĆU U NAŠIM ZASADIMA, INFEKTIVNI POTENCIJAL PATOGENA JE PRISUTAN U SKORO SVAKOM ZASADU I UKOLIKO SE PERIOD CVETANJA POKLOPI SA PADAVINAMA POSTOJI VISOK RIZIK OD NASTANKA INFEKCIJA. INFEKCIJA SE OSTVARUJE PREKO ŽIGA TUČKA U PRISUSTVU PADAVINA ILI VISOKE VLAŽNOSTI NA TEMPERATURAMA OD 5°C DO 25°C.

UKOLIKO JE VEĆ OSTVARENA INFEKCIJA NIJE MOGUĆE SPREČITI DALJI RAZVOJ BOLESTI, TE JE NEOPHODNO SPROVESTI PREVENTIVNE MERE ZAŠTITE.

PREPORUKA

U ZASADIMA VOĆA KOJE SE NALAZI U FAZI CVETANJA, PREPORUČUJE SE SPROVOĐENJE PREVENTIVNOG TRETMANA REGISTROVANIM FUNGICIDIMA SA CILJEM ZAŠTITE OD MONILIOZA. TRETMAN TREBA SPROVESTI PRED NAJAVLJENE PADAVINE.

PREPARAT	AKTIVNA MATERIJ	KONCENTRACIJA
CIPRODEX, NEON, CHORUS 50 WG	CIPRODINIL	0.05%

PRILIKOM PRIMENE PESTICIDA TREBA PREDUZETI SVE MERE ZAŠTITE PČELA I DRUGIH OPRAŠIVAČA. SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA TREBA KORISTITI PRAVILNO, U SKLADU SA UPUTSTVOM NAVEDENIM NA ETIKETI I U SKLADU SA DOBROM POLJOPRIVREDNOM PRAKSOM.

U PERIODU CVETANJA VOĆA ZABRANJENA JE PRIMENA INSEKTICIDA!



SLIKA 1. CVETANJE KAJSIJE



SLIKA 2. POČETAK CVETANJA NEKTARINE



SLIKA 3. SIMPTOM SUŠENJA CVETA I MLADARA NA NEKTARINI



SLIKA 4. MUMIFICIRANI PLOD BRESKVE



SLIKA 5. MUMIFICIRANI PLODOVI



SLIKA 6. PČELA NA CVETU NEKTARINE

.....

POŠTOVANI POLJOPRIVREDNI PROIZVOĐAČI I DRAGI GLEDAOCI, DETALJNIJE INFORMACIJE O POJAVI ŠTETNIH ORGANIZAMA I MERAMA KONTROLE MOŽETE POGLEDATI NA SAJTU PROGNOZNO IZVEŠTAJNE SLUŽBE ZAŠTITE BILJA VOJVODINE WWW.PISVOJVODINA.COM