

POŠTOVANI POLJOPRIVREDNI PROIZVOĐAČI I DRAGI GLEDAOCI DOBRO DOŠLI U „ZELENU PROGNOZU“
DANAS VAS INFORMIŠEMO O ZDRAVSTVENOM STANJU USEVA JEČMA

.....

NA PODRUČJU VOJVODINE USEVI JEČMA SE, U ZAVISNOSTI OD LOKALITETA, SORTIMENTA I PRIMENJENIH AGROTEHNIČKIH MERA, NALAZE U FAZI OD KRAJA BOKORENJA DO FORMIRANOG PRVOG KOLENCA.

VIZUELNIM PREGLEDIMA USEVA REGISTROVANO JE PRISUSTVO SIMPTOMA TRI BOLESTI JEČMA:

- MREŽASTE PEGAVOSTI LISTA JEČMA (*Pyrenophora teres*)
- PEPELNICE ŽITA (*Erysiphe graminis*) I
- SOČIVASTE PEGAVOSTI LISTA JEČMA (*Rhynchosporium secalis*)

TREKUTNI NIVO PRISUSTVA SIMPTOMA BILJNIH BOLESTI NA USEVIMA JEČMA JE RAZLIČIT I ZAVISI OD LOKALITETA, SORTIMENTA, UZRASTA I SKLOPA BILJAKA, PREDUSEVA, UČESTALOSTI GAJENJA JEČMA NA ODREĐENOM PODRUČJU I DR.

OD NAVEDENIH BOLESTI, NAJZNAČAJNIJE JE PRISUSTVO MREŽASTE PEGAVOSTI LISTA JEČMA. NA PARCELAMA IZ NAJRANIJIH ROKOVA SETVE, GDE SU SIMPTOMI MREŽASTE PEGAVOSTI NA LISTU UOČENI JOŠ U TREĆOJ DEKADI OKTOBRA, SADA SE REGISTRUJU SIMPTOMI I NA PREKO 70% BILJAKA.

PRVI SIMPTOMI OVOG OBOLJENJA SE JAVLJAJU U VIDU SITNIH NEKROTIČNIH CRTICA ILI PEGICA, KOJE SE VRLO BRZO POVEĆAVAJU PRAVEĆI USKE TAMNOMRKE POPREČNE I IZDUŽENE PRUGE TE CEO SIMPTOM PODSEĆA NA KARAKTERISTIČNU MREŽU NA LISTU. VREMENOM OBOLELI DEO NEKROTIRA DOK JE OSTALI DEO LISTA IZRAŽENO HLOROTIČAN. ZNAČAJNO PRISUSTVO MREŽASTE PEGAVOSTI, ALI I DRUGIH OBOLJENJA POPUT PEPELNICE I SOČIVASTE PEGAVOSTI, SMANJUJE ASIMILACIONU POVRŠINU LISTA I DOVODI DO SMANJENJA TEŽINE ZRNA, ODNOSNO SMANJENJA PRINOSA JEČMA.

PREPORUKA

NA POJEDINIM PARCELAMA JEČMA, KOJI SU UŠLI U OSETLJIVU FAZU RAZVOJA, FAZU VLATANJA, POSTIGNUTI SU EPIDEMIJSKI PRAGOV I ŠTETNOSTI. MEĐUTIM, VREMENSKI USLOVI NISU POGODNI ZA SPROVOĐENJE HEMIJSKIH MERA ZAŠTITE.

OD POČETKA NAREDNE SEMICE SE NAJAVLJUJE STABILIZACIJA VREMENSKIH PRILIKA, TE SE PROIZVOĐAČIMA PREPORUČUJE PREGLED USEVA U CILJU UTVRĐIVANJA PRISUSTVA SIMPTOMA BOLESTI I FAZE RAZVOJA USEVA.


ČIM DOĐE DO POVEĆANJA TEMPERATURE VAZDUHA, ČIME BI SE OMOGUĆILO EFIKASNO DELOVANJE FUNGICIDA, NA PARCELAMA GDE SE U FAZI PRVOG KOLENCA UTVRDI PREKO 10% BILJAKA SA SIMPTOMIMA BOLESTI, PREPORUKA JE PRIMENA HEMIJSKIH MERA ZAŠTITE. U USEVIMA JEČMA, ZA SUZBIJANJE PROUZROKOVAČA BOLESTI LISTA I STABLA SU REGISTROVANI SLEDEĆI FUNGICIDI:

| PREPARAT | AKTIVNA MATERIJA | DOZA |
|---------------|--|---------------|
| ELATUS PLUS | BENZOVINDIFLUPIR | 0,75 KG/HA |
| PROTENDO | PROTIOKONAZOL | 0,8 L/HA |
| DUETT ULTRA | EPOSIKONAZOL+TIOFANAT METIL | 0,4 -0,6 L/HA |
| ELATUS ERA | PROTIOKONAZOL+BENZOVINDIFLUPIR | 0,5-1 L/HA |
| DELARO 325 SC | PROTIOKONAZOL+TRIFLOKSISTROBIN | 0,7-1 L/HA |
| DELARO FORTE | PROTIOKONAZOL+SPIROKSAMIN+TRIFLOKSISTROBIN | 0,75 L/HA |
| FALCON FORTE | SPIROKSAMIN+ TEBUKONAZOL+PROTIOKONAZOL | 0,7-1 L/HA |
| AMISTAR EXTRA | AZOKSISTROBIN+CIPROKONAZOL | 0,5-0,75 L/HA |
| TEATAR PLUS | AZOKSISTROBIN+DIFENOKONAZOL | 0,6-1 L/HA |
| ANTRE PLUS | TEBUKONAZOL+TIOFANAT-METIL | 1,5 L/HA |
| SPHERE | TRIFLOKSISTROBIN+CIPROKONAZOL | 0,5 L/HA |
| ZANTARA | TEBUKONAZOL+BIKSAFEN | 1-1,25 L/HA |
| ASCRA XPRO | BIKSAFEN+SPIROKSAMIN+PROTIOKONAZOL | 0,9-1,2 L/HA |
| CAYUNIS | BIKSAFEN+SPIROKSAMIN+TRIFLOKSISTROBIN | 0,8-1 L/HA |
| PRIAXOR EC | FLUKSAPIROKSAD+PIRAKLOSTROBIN | 0,75-1,5 L/HA |

HEMIJSKE MERE ZAŠTITE TREBA SPROVESTI KADA TEMPERATURE VAZDUHA DOSTIGNU 15°C ZBOG EFIKASNIJEG DELOVANJA FUNGICIDA.



SLIKA 1. SIMPTOM MREŽASTE PEGAVOSTI LISTA JEČMA



SLIKA 2. SIMPTOMI MREŽASTE PEGAVOSTI LISTA JEČMA



SLIKA 3. SIMPTOM MREŽASTE PEGAVOSTI NA LISTU JEČMA



SLIKA 4. SIMPTOMI PEPELNICE NA LISTU JEČMA



SLIKA 5. SIMPTOMI SOČIVASTE PEGAVOSTI LISTA JEČMA

POŠTOVANI POLJOPRIVREDNI PROIZVOĐAČI I POŠTOVANI GLEDAOCI, DETALJNIJE INFORMACIJE O POJAVI ŠTETNIH ORGANIZAMA I MERAMA KONTROLE MOŽETE POGLEDATI NA SAJTU PROGNOZNO IZVEŠTAJNE SLUŽBE ZAŠTITE BILJA VOJVODINE WWW.PISVOJVODINA.COM